

Lista das Aves do Brasil
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO)
Versão 1/2/2005

www.ib.usp.br/cbro

Uma nova listagem das aves ocorrentes em território brasileiro é aqui apresentada. Além da incorporação dos novos táxons e novas ocorrências, diversas alterações na sequência, no arranjo e na grafia dos táxons foram implementadas.

A estrutura da lista, sobretudo a sequência, foi baseada grandemente na lista de aves do SACC – *South American Classification Committee* da AOU – *American Ornithologists' Union* (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html), mas há discordâncias diversas. Estas foram efetivadas, geralmente, a partir dos resultados constantes em certos trabalhos publicados, quando estes foram considerados procedentes pelo CBRO.

O CBRO, um “fórum destinado à discussão da classificação, nomenclatura e distribuição das aves brasileiras”, foi criado em abril de 1999 e oficializado como Grupo de Estudos da SBO – Sociedade Brasileira de Ornitologia em 2004.

Foi dada especial atenção à autoria e datação dos táxons, incluindo aquelas dos nomes dos táxons superiores. Os nomes em Português, um único para cada espécie, têm caráter meramente instrumental e não devem ser entendidos como uma tentativa de normatização. Para uma listagem abrangente dos nomes populares recomenda-se consultar o saite do Centro de Estudos Ornitológicos (www.ib.usp.br/ceo/nomespop.htm).

Além da lista primária (a lista principal) de aves brasileiras, há duas outras listas: secundária e terciária, que serão igualmente organizadas e permanentemente atualizadas pelo CBRO. Uma definição técnica de cada uma destas é dada a seguir.

Lista Primária - Espécies com pelo menos um dos registros de ocorrência no Brasil provido de evidência documental. Neste contexto, são evidências documentais os itens disponíveis, para consulta independente, na forma exclusiva de espécime integral ou parcial, fotografia, gravação de áudio ou vídeo, que permitam a determinação segura do táxon.

Lista Secundária - Espécies com provável ocorrência no Brasil, providas de registros específicos publicados para o país, mas cuja evidência documental não é conhecida ou disponível. Neste contexto, a ‘provável ocorrência’ de uma espécie no Brasil é inferida a partir do seu padrão distribucional e de dispersão estabelecido com base em evidências documentais

Lista Terciária - Espécies providas de registros específicos publicados para o país, mas com evidência documental inválida ou com improvável ocorrência no Brasil e carentes de evidência documental

Neste documento constam as espécies da lista primária acrescidas daquelas da lista secundária, as quais estão indicadas entre colchetes.

Recomenda-se a seguinte citação para as listas:

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2005) *Listas das aves do Brasil*. Versão 1/2/2005. Disponível em <<http://www.ib.usp.br/cbro>>. Acesso em: [data do acesso].

Legenda:

ORDEM (-iformes)

SUBORDEM (-i)

PARVORDEM (-ida)

SUPERFAMÍLIA (-oidea)

FAMÍLIA (-idae)

SUBFAMÍLIA (-inae)

Nome científico

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|----------------------------|
| STRUTHIONIFORMES Latham, 1790 | |
| RHEIDAE Bonaparte, 1849 | |
| <i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758) | ema |
| TINAMIFORMES Huxley, 1872 | |
| TINAMIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815 | azulona |
| <i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819) | macuco |
| <i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) | inhambu-de-cabeça-vermelha |
| <i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863 | inhambu-galinha |
| <i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789) | inhambu-preto |
| <i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783) | tururim |
| <i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815) | inhambuguaçu |
| <i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815) | jaó |
| <i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815) | inhambu-relógio |
| <i>Crypturellus duidae</i> Zimmer, 1938 | inhambu-de-pé-cinza |
| <i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863) | inhambu-de-perna-vermelha |
| <i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820) | jaó-do-sul |
| <i>Crypturellus atrocapillus</i> (Tschudi, 1844) | inhambu-de-coroa-preta |
| <i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) | inhambu-anhangá |
| <i>Crypturellus brevirostris</i> (Pelzeln, 1863) | inhambu-carijó |
| <i>Crypturellus bartletti</i> (Sclater & Salvin, 1873) | inhambu-anhangáí |
| <i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827) | inhambu-chororó |
| <i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815) | inhambu-chintã |
| <i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815) | perdiz |
| <i>Nothura boraquira</i> (Spix, 1825) | codorna-do-nordeste |
| <i>Nothura minor</i> (Spix, 1825) | codorna-mineira |
| <i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815) | codorna-amarela |
| <i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815) | inhambu-carapé |
| ANSERIFORMES Linnaeus, 1758 | |
| ANHIMIDAE Stejneger, 1885 | |
| <i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766) | anhuma |
| <i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816) | tachã |
| ANATIDAE Leach, 1820 | |
| DENDROCYGNINAE Reichenbach, 1850 | |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816) | marreca-caneleira |
| <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766) | irerê |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758) | asa-branca |
| ANSERINAE Vigors, 1825 | |
| <i>Cygnus melancoryphus</i> (Molina, 1782) | cisne-de-pescoço-preto |
| <i>Coscoroba coscoroba</i> (Molina, 1782) | capororoca |
| ANATINAE Leach, 1820 | |
| <i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825) | pato-corredor |
| <i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758) | pato-do-mato |
| <i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907 | pato-de-crista |
| <i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816) | marreca-de-coleira |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789) | pé-vermelho |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|-----------------------------|
| <i>Anas sibilatrix</i> Poepig, 1829 | marreca-oveira |
| <i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816 | marreca-pardinha |
| [<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758] | |
| <i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789 | marreca-parda |
| <i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758 | marreca-toicinho |
| <i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816 | marreca-cricri |
| <i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766 | marreca-de-asa-azul |
| <i>Anas cyanoptera</i> Vieillot, 1816 | marreca-colorada |
| <i>Anas platalea</i> Vieillot, 1816 | marreca-colhereira |
| <i>Netta erythrophthalma</i> (Wied, 1832) | paturi-preta |
| <i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816) | marrecão |
| <i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817 | pato-mergulhão |
| <i>Heteronetta atricapilla</i> (Merrem, 1841) | marreca-de-cabeça-preta |
| <i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766) | marreca-de-bico-roxo |
| <i>Oxyura vittata</i> (Philippi, 1860) | marreca-pé-na-bunda |
| GALLIFORMES Linnaeus, 1758 | |
| CRACIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Ortalis canicollis</i> (Wagler, 1830) | aracuã-do-pantanal |
| <i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825) | aracuã |
| <i>Ortalis motmot</i> (Linnaeus, 1766) | aracuã-pequeno |
| <i>Ortalis superciliaris</i> (Gray, 1867) | aracuã-de-sobrancelhas |
| <i>Penelope marail</i> (Statius Muller, 1776) | jacumirim |
| <i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815 | jacupemba |
| <i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 | jacu-de-spix |
| <i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815 | jacuaçu |
| <i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830 | jacupiranga |
| <i>Penelope ochrogaster</i> Pelzeln, 1870 | jacu-de-barriga-castanha |
| <i>Penelope jacucaca</i> Spix, 1825 | jacucaca |
| <i>Pipile cumanensis</i> (Jacquin, 1784) | jacutinga-de-garganta-azul |
| <i>Pipile cujubi</i> (Pelzeln, 1858) | cujubi |
| <i>Pipile jacutinga</i> (Spix, 1825) | jacutinga |
| <i>Nothocrax urumutum</i> (Spix, 1825) | urumutum |
| <i>Mitu tomentosum</i> (Spix, 1825) | mutum-do-norte |
| <i>Mitu tuberosum</i> (Spix, 1825) | mutum-cavalo |
| <i>Mitu mitu</i> (Linnaeus, 1766) | mutum-do-nordeste |
| <i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 | mutum-poranga |
| <i>Crax globulosa</i> Spix, 1825 | mutum-de-fava |
| <i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825 | mutum-de-penacho |
| <i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825 | mutum-de-bico-vermelho |
| ODONTOPHORIDAE Gould, 1844 | |
| <i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) | uru-do-campo |
| <i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789) | uru-corcovado |
| <i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825) | uru |
| <i>Odontophorus stellatus</i> (Gould, 1843) | uru-de-topete |
| PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888 | |
| PODICIPEDIDAE Bonaparte, 1831 | |
| <i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824) | mergulhão-de-orelha-branca |
| <i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766) | mergulhão-pequeno |
| <i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758) | mergulhão-caçador |
| <i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783) | mergulhão-grande |
| <i>Podiceps occipitalis</i> Garnot, 1826 | mergulhão-de-orelha-amarela |
| SPHENISCIFORMES Sharpe, 1891 | |
| SPHENISCIDAE Bonaparte, 1831 | |
| <i>Aptenodytes patagonicus</i> Miller, 1778 | pingüim-rei |
| <i>Eudyptes chrysocome</i> (Forster, 1781) | pingüim-de-penacho-amarelo |
| <i>Eudyptes chrysolophus</i> (Brandt, 1837) | pingüim-de-testa-amarela |
| <i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781) | pingüim-de-magalhães |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|---------------------------------|
| PROCELLARIIFORMES Fürbringer, 1888 | |
| DIOMEDEIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Phoebetria fusca</i> (Hilsenberg, 1822) | piau-preto |
| <i>Phoebetria palpebrata</i> (Forster, 1785) | piau-de-costas-claras |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789) | albatroz-de-nariz-amarelo |
| <i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828) | albatroz-de-sobrancelha |
| <i>Thalassarche chrysostoma</i> (Forster, 1785) | albatroz-de-cabeça-cinza |
| <i>Thalassarche cauta</i> (Gould, 1841) | albatroz-arisco |
| <i>Diomedea epomophora</i> Lesson, 1825 | albatroz-real |
| <i>Diomedea sanfordi</i> Murphy, 1917 | albatroz-real-do-norte |
| <i>Diomedea exulans</i> Linnaeus, 1758 | albatroz-gigante |
| <i>Diomedea dabbenena</i> Mathews, 1929 | albatroz-de-tristão |
| PROCELLARIIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789) | petrel-gigante |
| <i>Macronectes halli</i> Mathews, 1912 | petrel-gigante-do-norte |
| <i>Fulmarus glacialis</i> (Smith, 1840) | pardelão-prateado |
| <i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758) | pomba-do-cabo |
| <i>Lugensa brevirostris</i> (Lesson, 1831) | grazina-de-bico-curto |
| <i>Pterodroma neglecta</i> (Schlegel, 1863) | petrel-de-kermadec |
| <i>Pterodroma macroptera</i> (Smith, 1840) | fura-bucho-de-cara-cinza |
| <i>Pterodroma mollis</i> (Gould, 1844) | grazina-mole |
| [<i>Pterodroma hasitata</i> (Kuhl, 1820)] | |
| <i>Pterodroma incerta</i> (Schlegel, 1863) | grazina-de-barriga-branca |
| <i>Pterodroma lessonii</i> (Garnot, 1826) | grazina-de-cabeça-branca |
| <i>Pterodroma arminjoniana</i> (Giglioli & Salvadori, 1869) | grazina-de-trindade |
| <i>Halobaena caerulea</i> (Gmelin, 1789) | petrel-azul |
| <i>Pachyptila vittata</i> (Forster, 1777) | faigão-de-bico-largo |
| <i>Pachyptila desolata</i> (Gmelin, 1789) | faigão-rola |
| <i>Pachyptila belcheri</i> (Mathews, 1912) | faigão-de-bico-fino |
| [<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828)] | |
| <i>Procellaria cinerea</i> Gmelin, 1789 | pardela-cinza |
| <i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758 | pardela-preta |
| <i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844 | pardela-de-óculos |
| <i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769) | bobo-grande |
| <i>Calonectris edwardsii</i> (Oustalet, 1883) | bobo-de-cabo-verde |
| <i>Puffinus griseus</i> (Gmelin, 1789) | bobo-escuro |
| <i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818) | bobo-grande-de-sobre-branco |
| <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) | bobo-pequeno |
| [<i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838] | |
| <i>Puffinus lherminieri</i> Lesson, 1839 | pardela-de-asa-larga |
| HYDROBATIDAE Mathews, 1912 | |
| <i>Fregetta grallaria</i> (Vieillot, 1818) | painho-de-barriga-branca |
| <i>Fregetta tropica</i> (Gould, 1844) | painho-de-barriga-preta |
| <i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820) | alma-de-mestre |
| <i>Pelagodroma marina</i> (Latham, 1790) | painho-de-ventre-branco |
| [<i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851)] | |
| <i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818) | painho-de-cauda-furcada |
| PELECANOIDIDAE Gray, 1871 | |
| <i>Pelecanoides magellani</i> (Mathews, 1912) | petrel-mergulhador-de-magalhães |
| PELECANIFORMES Sharpe, 1891 | |
| PHAETHONTIDAE Brandt, 1840 | |
| <i>Phaethon aethereus</i> Linnaeus, 1758 | rabo-de-palha-de-bico-vermelho |
| <i>Phaethon rubricauda</i> Boddaert, 1783 | rabo-de-palha-de-cauda-vermelha |
| <i>Phaethon lepturus</i> Daudin, 1802 | rabo-de-palha-de-bico-laranja |
| PELECANIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Pelecanus occidentalis</i> Linnaeus, 1766 | pelicano-pardo |
| SULIDAE Reichenbach, 1849 | |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-------------------------|
| <i>Morus capensis</i> (Lichtenstein, 1823) | atobá-do-cabo |
| <i>Morus serrator</i> Gray, 1843 | atobá-australiano |
| <i>Sula dactylatra</i> Lesson, 1831 | atobá-grande |
| <i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766) | atobá-de-pé-vermelho |
| <i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783) | atobá-pardo |
| PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849 | |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789) | biguá |
| [<i>Phalacrocorax bransfieldensis</i> Murphy, 1936] | |
| ANHINGIDAE Reichenbach, 1849 | |
| <i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766) | biguatinga |
| FREGATIDAE Degland & Gerbe, 1867 | |
| <i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914 | tesourão |
| <i>Fregata minor</i> (Gmelin, 1789) | tesourão-grande |
| <i>Fregata ariel</i> (Gray, 1845) | tesourão-pequeno |
| CICONIIFORMES Bonaparte, 1854 | |
| ARDEIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783) | socó-boi |
| <i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825) | socó-boi-escuro |
| <i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789) | garça-da-mata |
| <i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766) | arapapá |
| <i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789) | socoí-zigue-zague |
| <i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829) | socó-boi-baio |
| <i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789) | socoí-vermelho |
| <i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823) | socoí-amarelo |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | savacu |
| <i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758) | savacu-de-coroa |
| <i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758) | socozinho |
| <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) | garça-caranguejeira |
| <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | garça-vaqueira |
| <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | garça-real-européia |
| [<i>Ardea herodias</i> Linnaeus, 1758] | |
| <i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766 | |
| [<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766] | garça-moura |
| <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758 | |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824) | garça-branca-grande |
| <i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783) | maria-faceira |
| <i>Egretta tricolor</i> (Statius Muller, 1776) | garça-real |
| [<i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792)] | garça-tricolor |
| <i>Egretta thula</i> (Molina, 1782) | |
| <i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | garça-branca-pequena |
| THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904 | garça-azul |
| <i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758) | guará |
| <i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817) | caraúna-de-cara-branca |
| <i>Cercibis oxycerca</i> (Spix, 1825) | trombeteiro |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789) | coró-coró |
| <i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823) | tapicuru-de-cara-pelada |
| <i>Theristicus caerulescens</i> (Vieillot, 1817) | maçarico-real |
| <i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783) | curicaca |
| [<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758] | |
| <i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758 | colhereiro |
| CICONIIDAE Sundevall, 1836 | |
| <i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789) | maguari |
| <i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819) | tuiuiú |
| <i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758 | cabeça-seca |
| PHOENICOPTERIFORMES Fürbringer, 1888 | |
| PHOENICOPTERIDAE Bonaparte, 1831 | |
| <i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758 | flamingo |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|---------------------------|
| <i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782 | flamingo-chileno |
| <i>Phoenicoparrus andinus</i> (Philippi, 1854) | flamingo-grande-dos-andes |
| CATHARTIFORMES Seebohm, 1890 | |
| CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839 | |
| <i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758) | urubu-de-cabeça-vermelha |
| <i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845 | urubu-de-cabeça-amarela |
| <i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964 | urubu-da-mata |
| <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793) | urubu-de-cabeça-preta |
| <i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758) | urubu-rei |
| [<i>Vultur gryphus</i> Linnaeus, 1758] | |
| FALCONIFORMES Bonaparte, 1831 | |
| PANDIONIDAE Bonaparte, 1854 | |
| <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | águia-pescadora |
| ACCIPITRIDAE Vigors, 1824 | |
| <i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790) | gavião-de-cabeça-cinza |
| <i>Leptodon forbesi</i> (Swann, 1922) | gavião-de-pescoço-branco |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822) | caracoleiro |
| <i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758) | gavião-tesoura |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825 | gaviãozinho |
| <i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818) | gavião-peneira |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817) | gavião-caramujeiro |
| <i>Rostrhamus hamatus</i> (Temminck, 1821) | gavião-do-igapó |
| <i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790) | gavião-ripina |
| <i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823) | gavião-bombachinha |
| <i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811) | sauveiro-do-norte |
| <i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788) | sovi |
| <i>Circus cinereus</i> Vieillot, 1816 | gavião-cinza |
| <i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788) | gavião-do-banhado |
| <i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824) | tauató-pintado |
| <i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) | gavião-miudinho |
| <i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808 | gavião-miúdo |
| <i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817) | gavião-bombachinha-grande |
| <i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817) | gavião-pernilongo |
| <i>Leucopternis schistaceus</i> (Sundevall, 1851) | gavião-azul |
| <i>Leucopternis melanops</i> (Latham, 1790) | gavião-de-cara-preta |
| <i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850 | gavião-vaqueiro |
| <i>Leucopternis lacermulatus</i> (Temminck, 1827) | gavião-pombo-pequeno |
| <i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790) | gavião-branco |
| <i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847) | gavião-pombo-grande |
| <i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788) | caranguejeiro |
| [<i>Buteogallus anthracinus</i> (Deppe, 1830)] | |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788) | gavião-preto |
| <i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790) | gavião-caboclo |
| <i>Harpyhaliaetus coronatus</i> (Vieillot, 1817) | águia-cinzenta |
| <i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790) | gavião-belo |
| <i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824) | gavião-asa-de-telha |
| <i>Percnohierax leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824) | gavião-de-sobre-branco |
| <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788) | gavião-carijó |
| <i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816 | gavião-de-rabo-branco |
| [<i>Buteo polyosoma</i> (Quoy & Gaimard, 1824)] | |
| <i>Buteo melanoleucus</i> (Vieillot, 1819) | águia-chilena |
| <i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790) | gavião-pedrês |
| <i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823) | gavião-de-asa-larga |
| <i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838 | gavião-papa-gafanhoto |
| <i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816 | gavião-de-cauda-curta |
| <i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847 | gavião-de-rabo-barrado |
| <i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800) | uiracu-falso |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-----------------------------|
| <i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758) | gavião-real |
| <i>Spizastur melanoleucus</i> (Vieillot, 1816) | gavião-pato |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820) | gavião-pega-macaco |
| <i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800) | gavião-de-penacho |
| FALCONIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816 | gavião-de-anta |
| <i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783) | gralhão |
| <i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784) | caracará-do-norte |
| <i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777) | caracará |
| <i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816) | carrapateiro |
| <i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816) | chimango |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758) | acauã |
| <i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817) | falcão-caburé |
| <i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817) | falcão-mateiro |
| <i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002 | falcão-críptico |
| <i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862) | tanatau |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817) | falcão-relógio |
| <i>Micrastur buckleyi</i> Swann, 1919 | falcão-de-buckley |
| [<i>Spizapteryx circumcincta</i> (Kaup, 1852)] | |
| <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758 | quiriquiri |
| <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | esmerilhão |
| <i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800 | cauré |
| <i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825 | falcão-de-peito-laranja |
| <i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822 | falcão-de-coleira |
| <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | falcão-peregrino |
| GRUIFORMES Bonaparte, 1854 | |
| ARAMIDAE Bonaparte, 1852 | |
| <i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766) | carão |
| PSOPHIIDAE Bonaparte, 1831 | |
| <i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 | jacamim-de-costas-cinzentas |
| <i>Psophia leucoptera</i> Spix, 1825 | jacamim-de-costas-brancas |
| <i>Psophia viridis</i> Spix, 1825 | jacamim-de-costas-verdes |
| RALLIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Coturnicops notatus</i> (Gould, 1841) | pinto-d'água-carijó |
| <i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848) | maxalalagá |
| <i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783 | saracura-matraca |
| <i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819) | saracuruçu |
| <i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825) | saracura-do-mangue |
| <i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776) | saracura-três-potes |
| <i>Aramides calopterus</i> Sclater & Salvin, 1878 | saracura-de-asa-vermelha |
| <i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825) | saracura-do-mato |
| <i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847) | saracura-lisa |
| <i>Anurolimnas castaneiceps</i> (Sclater & Salvin, 1869) | sanã-de-cabeça-castanha |
| <i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776) | sanã-castanha |
| <i>Laterallus fasciatus</i> (Sclater & Salvin, 1868) | sanã-zebrada |
| <i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819) | sanã-parda |
| <i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831) | sanã-do-capim |
| <i>Laterallus jamaicensis</i> (Gmelin, 1789) | açanã-preta |
| <i>Laterallus leucopyrrhus</i> (Vieillot, 1819) | sanã-vermelha |
| <i>Laterallus xenopterus</i> Conover, 1934 | sanã-de-cara-ruiva |
| <i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783) | sanã-amarela |
| <i>Porzana spiloptera</i> Durnford, 1877 | sanã-cinza |
| <i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819) | sanã-carijó |
| <i>Neocrex erythrops</i> (Sclater, 1867) | туру-туру |
| <i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783) | saracura-carijó |
| <i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819) | saracura-sanã |
| <i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1837) | saracura-do-banhado |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|----------------------------------|
| <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | frango-d'água-comum |
| <i>Gallinula melanops</i> (Vieillot, 1819) | frango-d'água-carijó |
| <i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766) | frango-d'água-azul |
| <i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789) | frango-d'água-pequeno |
| <i>Fulica armillata</i> Vieillot, 1817 | carqueja-de-bico-manchado |
| <i>Fulica rufifrons</i> Philippi & Landbeck, 1861 | carqueja-de-escudo-vermelho |
| <i>Fulica leucoptera</i> Vieillot, 1817 | carqueja-de-bico-amarelo |
| HELIORNITHIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783) | picaparra |
| EURYPYGIDAE Selby, 1840 | |
| <i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781) | pavãozinho-do-pará |
| CARIAMIDAE Bonaparte, 1850 | |
| <i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766) | seriema |
| CHARADRIIFORMES Huxley, 1867 | |
| JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854 | |
| <i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766) | jaçanã |
| ROSTRATULIDAE Mathews, 1914 | |
| <i>Nycticryphes semicollaris</i> (Vieillot, 1816) | narceja-de-bico-torto |
| HAEMATOPODIDAE Bonaparte, 1838 | |
| <i>Haematopus palliatus</i> Temminck, 1820 | piru-piru |
| RECURVIROSTRIDAE Bonaparte, 1831 | |
| <i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776) | pernilongo-de-costas-negras |
| <i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817 | pernilongo-de-costas-brancas |
| BURHINIDAE Mathews, 1912 | |
| <i>Burhinus bistriatus</i> (Wagler, 1829) | téu-téu-da-savana |
| GLAREOLIDAE Brehm, 1831 | |
| <i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766) | perdiz-do-mar |
| CHARADRIIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790) | batuíra-de-esporão |
| <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782) | quero-quero |
| <i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776) | batuiruçu |
| <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | batuiruçu-de-axila-preta |
| <i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825 | batuíra-de-bando |
| <i>Charadrius melodus</i> Ord, 1824 | batuíra-melodiosa |
| <i>Charadrius wilsonia</i> Ord, 1814 | batuíra-bicuda |
| <i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818 | batuíra-de-coleira |
| <i>Charadrius falklandicus</i> Latham, 1790 | batuíra-de-coleira-dupla |
| <i>Charadrius modestus</i> Lichtenstein, 1823 | batuíra-de-peito-tijolo |
| <i>Oreopholus ruficollis</i> (Wagler, 1829) | batuíra-de-papo-ferrugíneo |
| SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816) | narceja |
| <i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783) | narcejão |
| <i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789) | maçarico-de-costas-brancas |
| <i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758) | maçarico-de-bico-virado |
| [<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)] | |
| <i>Numenius borealis</i> (Forster, 1772) | maçarico-esquimó |
| <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | maçarico-galego |
| <i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812) | maçarico-do-campo |
| [<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)] | |
| <i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789) | maçarico-grande-de-perna-amarela |
| <i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789) | maçarico-de-perna-amarela |
| <i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813 | maçarico-solitário |
| <i>Catoptrophorus semipalmatus</i> (Gmelin, 1789) | maçarico-de-asa-branca |
| <i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766) | maçarico-pintado |
| [<i>Xenus cinereus</i> (Guldenstadt, 1775)] | |
| <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | vira-pedras |
| <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | maçarico-de-papo-vermelho |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|------------------------------|
| <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | maçarico-branco |
| <i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766) | maçarico-rasteirinho |
| <i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819) | maçariquinho |
| <i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819) | maçarico-de-sobre-branco |
| <i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861) | maçarico-de-bico-fino |
| <i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819) | maçarico-de-colete |
| <i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826) | maçarico-pernilongo |
| <i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819) | maçarico-acanelado |
| [<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)] | |
| <i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819) | pisa-n'água |
| <i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758) | falaropo-de-bico-grosso |
| [THINOCORIDAE Sundevall, 1836 | |
| <i>Thinocorus rumicivorus</i> (Eschscholtz, 1829)] | |
| CHIONIDAE Lesson, 1828 | |
| <i>Chionis albus</i> (Gmelin, 1789) | pomba-antártica |
| STERCORARIIDAE Gray, 1870 | |
| <i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764) | mandrião-grande |
| <i>Stercorarius chilensis</i> Bonaparte, 1857 | mandrião-chileno |
| <i>Stercorarius maccormicki</i> Saunders, 1893 | mandrião-do-sul |
| <i>Stercorarius antarcticus</i> (Lesson, 1831) | mandrião-antártico |
| <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815) | mandrião-pomarino |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | mandrião-parasítico |
| <i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819 | mandrião-de-cauda-comprida |
| LARIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Larus atlanticus</i> Olog, 1958 | gaivota-de-rabo-preto |
| <i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815 | gaivota-de-bico-manchado |
| <i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823 | gaivotão |
| <i>Larus atricilla</i> Linnaeus, 1758 | gaivota-alegre |
| <i>Larus pipixcan</i> Wagler, 1831 | gaivota-de-franklin |
| <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818) | gaivota-de-cabeça-cinza |
| <i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823) | gaivota-maria-velha |
| STERNIDAE Vigors, 1825 | |
| <i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758) | trinta-réis-escuro |
| <i>Anous minutus</i> Boie, 1844 | trinta-réis-preto |
| <i>Gygis alba</i> (Sparmann, 1786) | grazina |
| <i>Onychoprion fuscatus</i> (Linnaeus, 1766) | trinta-réis-das-rocas |
| <i>Sternula antillarum</i> Lesson, 1847 | trinta-réis-miúdo |
| <i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819) | trinta-réis-anão |
| <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | trinta-réis-negro |
| <i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789) | trinta-réis-grande |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789) | trinta-réis-de-bico-preto |
| <i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813 | trinta-réis-róseo |
| <i>Sterna hirundinacea</i> Lesson, 1831 | trinta-réis-de-bico-vermelho |
| <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | trinta-réis-boreal |
| <i>Sterna vittata</i> Gmelin, 1789 | trinta-réis-antártico |
| <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | trinta-réis-ártico |
| <i>Sterna trudeaui</i> Audubon, 1838 | trinta-réis-de-coroa-branca |
| <i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783) | trinta-réis-real |
| <i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787) | trinta-réis-de-bando |
| RYNCHOPIDAE Bonaparte, 1838 | |
| <i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758 | talha-mar |
| COLUMBIFORMES Latham, 1790 | |
| COLUMBIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758) | rolinha-cinzenta |
| <i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766) | rolinha-de-asa-canela |
| <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811) | rolinha-roxa |
| <i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831) | fogo-apagou |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-----------------------------|
| <i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813) | rolinha-picui |
| <i>Columbina cyanopsis</i> (Pelzelin, 1870) | rolinha-do-planalto |
| <i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886) | pararu-azul |
| <i>Claravis godefrida</i> (Temminck, 1811) | pararu-espelho |
| <i>Uropelia campestris</i> (Spix, 1825) | rolinha-vaqueira |
| <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | pombo-doméstico |
| <i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789) | pomba-trocal |
| <i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813) | pombão |
| <i>Patagioenas maculosa</i> (Temminck, 1813) | pomba-do-orvalho |
| <i>Patagioenas fasciata</i> (Say, 1823) | pomba-de-coleira-branca |
| <i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792) | pomba-galega |
| <i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818) | pomba-amargosa |
| <i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868) | pomba-botafogo |
| <i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847) | pomba-de-bando |
| <i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855 | juriti-pupu |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792) | juriti-gemeadeira |
| [<i>Geotrygon saphirina</i> Bonaparte, 1855] | |
| <i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809) | juriti-vermelha |
| <i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) | pariri |
| PSITTACIFORMES Wagler, 1830 | |
| PSITTACIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790) | arara-azul-grande |
| <i>Anodorhynchus glaucus</i> (Vieillot, 1816) | arara-azul-pequena |
| <i>Anodorhynchus leari</i> Bonaparte, 1856 | arara-azul-de-lear |
| <i>Cyanopsitta spixii</i> (Wagler, 1832) | ararinha-azul |
| <i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758) | arara-canindé |
| <i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758) | araracanga |
| <i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859 | arara-vermelha-grande |
| <i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758) | maracanã-guaçu |
| <i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783) | maracanã-de-cara-amarela |
| <i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816) | maracanã-do-buriti |
| <i>Primolius couloni</i> (Sclater, 1876) | maracanã-de-cabeça-azul |
| <i>Primolius auricollis</i> (Cassin, 1853) | maracanã-de-colar |
| <i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758) | maracanã-pequena |
| <i>Guarouba guarouba</i> (Gmelin, 1788) | ararajuba |
| <i>Aratinga acuticaudata</i> (Vieillot, 1818) | aratinga-de-testa-azul |
| <i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776) | periquitão-maracanã |
| <i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820) | jandaia-de-testa-vermelha |
| <i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788) | jandaia-verdadeira |
| <i>Aratinga solstitialis</i> (Linnaeus, 1766) | jandaia-amarela |
| <i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851) | periquito-de-cabeça-suja |
| <i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788) | periquito-rei |
| <i>Aratinga pertinax</i> (Linnaeus, 1758) | periquito-de-bochecha-parda |
| <i>Aratinga cactorum</i> (Kuhl, 1820) | periquito-da-caatinga |
| <i>Nandayus nenday</i> (Vieillot, 1823) | periquito-de-cabeça-preta |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> (Wied, 1820) | tiriba-grande |
| <i>Pyrrhura devillei</i> (Massena & Souancé, 1854) | tiriba-fogo |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817) | tiriba-de-testa-vermelha |
| <i>Pyrrhura lepida</i> (Wagler, 1832) | tiriba-pérola |
| <i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824) | tiriba-de-barriga-vermelha |
| <i>Pyrrhura molinae</i> (Massena & Souancé, 1854) | tiriba-de-cara-suja |
| <i>Pyrrhura leucotis</i> (Kuhl, 1820) | tiriba-de-orelha-branca |
| <i>Pyrrhura griseipectus</i> Salvadori, 1900 | tiriba-de-peito-cinza |
| <i>Pyrrhura pfrimeri</i> Miranda-Ribeiro, 1920 | tiriba-de-pfrimer |
| <i>Pyrrhura picta</i> (Statius Muller, 1776) | tiriba-de-testa-azul |
| <i>Pyrrhura lucianii</i> (Deville, 1851) | tiriba-de-deville |
| <i>Pyrrhura roseifrons</i> (Gray, 1859) | tiriba-de-cabeça-vermelha |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|-------------------------------|
| <i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906 | tiriba-de-hellmayr |
| <i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002 | tiriba-do-madeira |
| <i>Pyrrhura egregia</i> (Sclater, 1881) | tiriba-de-cauda-roxa |
| <i>Pyrrhura melanura</i> (Spix, 1824) | tiriba-fura-mata |
| <i>Pyrrhura rupicola</i> (Tschudi, 1844) | tiriba-rupestre |
| <i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783) | caturrita |
| <i>Forpus passerinus</i> (Linnaeus, 1758) | tuim-santo |
| <i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824) | tuim |
| <i>Forpus sclateri</i> (Gray, 1859) | tuim-de-bico-escuro |
| <i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788) | periquito-rico |
| <i>Brotogeris versicolurus</i> (Statius Muller, 1776) | periquito-de-asa-branca |
| <i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818) | periquito-de-encontro-amarelo |
| <i>Brotogeris cyanoptera</i> (Pelzeln, 1870) | periquito-de-asa-azul |
| <i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766) | periquito-de-asa-dourada |
| <i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776) | periquito-testinha |
| <i>Nannopsittaca panychlora</i> (Salvin & Godman, 1883) | periquito-dos-tepuis |
| <i>Nannopsittaca dachilleae</i> O'Neill, Munn & Franke, 1991 | periquito-da-amazônia |
| <i>Touit purpuratus</i> (Gmelin, 1788) | apuim-de-costas-azuis |
| <i>Touit melanonotus</i> (Wied, 1820) | apuim-de-costas-pretas |
| <i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830) | apuim-de-asa-vermelha |
| <i>Touit surdus</i> (Kuhl, 1820) | apuim-de-cauda-amarela |
| <i>Pionites melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758) | marianinha-de-cabeça-preta |
| <i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820) | marianinha-de-cabeça-amarela |
| <i>Pionopsitta vulturina</i> (Kuhl, 1820) | curica-urubu |
| <i>Pionopsitta aurantiocephala</i> Gaban-Lima, Raposo & Höfling, 2002 | papagaio-de-cabeça-laranja |
| <i>Pionopsitta barrabandi</i> (Kuhl, 1820) | curica-de-bochecha-laranja |
| <i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) | curica-caica |
| <i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769) | cuiú-cuiú |
| <i>Graydidascalus brachyurus</i> (Kuhl, 1820) | curica-verde |
| <i>Salvatoria xanthops</i> (Spix, 1824) | papagaio-galego |
| <i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) | maitaca-de-cabeça-azul |
| <i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820) | maitaca-verde |
| <i>Pionus fuscus</i> (Statius Muller, 1776) | maitaca-roxa |
| <i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830) | papagaio-charão |
| <i>Amazona autumnalis</i> (Linnaeus, 1758) | papagaio-diadema |
| <i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758) | papagaio-de-cara-roxa |
| [<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)] | |
| <i>Amazona rhodocorytha</i> (Salvadori, 1890) | chauá |
| <i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758) | papagaio-da-várzea |
| <i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758) | papagaio-verdadeiro |
| <i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788) | papagaio-campeiro |
| <i>Amazona kawalli</i> Grantsau & Camargo, 1989 | papagaio-dos-garbes |
| <i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) | curica |
| <i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) | papagaio-moleiro |
| <i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820) | papagaio-de-peito-roxo |
| <i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758) | anacã |
| <i>Tricharia malachitacea</i> (Spix, 1824) | sabiá-cica |
| OPISTHOCOMIFORMES Sclater, 1880 | |
| OPISTHOCOMIDAE Swainson, 1837 | |
| <i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776) | cigana |
| CUCULIFORMES Wagler, 1830 | |
| CUCULIDAE Leach, 1820 | |
| CUCULINAE Leach, 1820 | |
| [<i>Coccyzus pumilus</i> Strickland, 1852] | |
| <i>Coccyzus cinereus</i> Vieillot, 1817 | papa-lagarta-cinzento |
| <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (Wilson, 1811) | papa-lagarta-de-bico-preto |
| <i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758) | papa-lagarta-de-asa-vermelha |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|-------------------------------|
| <i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873 | papa-lagarta-de-euler |
| <i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788) | papa-lagarta-do-mangue |
| <i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817 | papa-lagarta-acanelado |
| <i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) | alma-de-gato |
| <i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) | chincoã-de-bico-vermelho |
| <i>Coccyua minuta</i> (Vieillot, 1817) | chincoã-pequeno |
| CROTOPHAGINAE Swainson, 1837 | |
| <i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788 | anu-coroca |
| <i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758 | anu-preto |
| <i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788) | anu-branco |
| NEOMORPHINAE Shelley, 1891 | |
| <i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766) | saci |
| <i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824) | peixe-frito-verdadeiro |
| <i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870 | peixe-frito-pavonino |
| <i>Neomorphus geoffroyi</i> (Temminck, 1820) | jacu-estalo |
| <i>Neomorphus squamiger</i> Todd, 1925 | jacu-estalo-escamoso |
| <i>Neomorphus rufipennis</i> (Gray, 1849) | jacu-estalo-de-asa-vermelha |
| <i>Neomorphus pucheranii</i> (Deville, 1851) | jacu-estalo-de-bico-vermelho |
| STRIGIFORMES Wagler, 1830 | |
| TYTONIDAE Mathews, 1912 | |
| <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | coruja-da-igreja |
| STRIGIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817) | corujinha-do-mato |
| <i>Megascops watsonii</i> (Cassin, 1849) | corujinha-orelhuda |
| <i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858) | corujinha-relógio |
| <i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822) | corujinha-sapo |
| <i>Megascops sanctaecatarinae</i> (Salvin, 1897) | corujinha-do-sul |
| <i>Megascops guatemalae</i> (Sharpe, 1875) | corujinha-de-roraima |
| <i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800) | coruja-de-crista |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) | murucututu |
| <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901) | murucututu-de-barriga-amarela |
| <i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788) | jacurutu |
| <i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825 | coruja-listrada |
| <i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849) | coruja-do-mato |
| <i>Strix huhula</i> Daudin, 1800 | coruja-preta |
| <i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990 | caburé-da-amazônia |
| <i>Glaucidium mooreorum</i> Silva, Coelho & Gonzaga, 2002 | caburé-de-pernambuco |
| <i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830) | caburé-miudinho |
| <i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788) | caburé |
| <i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782) | coruja-buraqueira |
| <i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849) | caburé-acanelado |
| <i>Rhinoptynx clamator</i> (Vieillot, 1808) | coruja-orelhuda |
| <i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832) | mocho-diabo |
| <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | mocho-dos-banhados |
| CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881 | |
| STEATORNITHIDAE Bonaparte, 1842 | |
| <i>Steatornis caripensis</i> Humboldt, 1817 | guácharo |
| NYCTIBIIDAE Chenu & Des Murs, 1851 | |
| <i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789) | mãe-da-lua-gigante |
| <i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820) | mãe-da-lua-parda |
| <i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789) | mãe-da-lua |
| <i>Nyctibius leucopterus</i> (Wied, 1821) | urutau-de-asa-branca |
| <i>Nyctibius bracteatus</i> Gould, 1846 | urutau-ferrugem |
| CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825 | |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789) | tuju |
| <i>Chordeiles pusillus</i> Gould, 1861 | bacurauzinho |
| <i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825) | bacurau-da-praia |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|--------------------------------|
| <i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783) | bacurau-de-asa-fina |
| <i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771) | bacurau-norte-americano |
| <i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825) | bacurau-de-cauda-barrada |
| <i>Nyctiprogne vielliardi</i> (Lencioni-Neto, 1994) | bacurau-do-são-francisco |
| <i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817) | corucão |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789) | bacurau |
| <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844) | bacurau-ocelado |
| <i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783 | joão-corta-pau |
| <i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (Cassin, 1849) | bacurau-rabo-de-seda |
| <i>Caprimulgus longirostris</i> Bonaparte, 1825 | bacurau-da-telha |
| <i>Caprimulgus cayennensis</i> Gmelin, 1789 | bacurau-de-cauda-branca |
| <i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Lawrence, 1862) | bacurau-de-rabo-maculado |
| <i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837 | bacurau-chintã |
| <i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848 | bacurau-de-lajeado |
| <i>Caprimulgus whitelyi</i> (Salvin, 1885) | bacurau-dos-tepui |
| <i>Caprimulgus hirundinaceus</i> Spix, 1825 | bacurauzinho-da-caatinga |
| <i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844) | acurana |
| <i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789) | bacurau-tesoura |
| <i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840) | bacurau-tesoura-gigante |
| <i>Eleothreptus anomalus</i> (Gould, 1838) | curiango-do-banhado |
| <i>Eleothreptus candicans</i> (Pelzeln, 1867) | bacurau-de-rabo-branco |
| APODIFORMES Peters, 1940 | |
| APODIDAE Olphe-Galliard, 1887 | |
| [<i>Cypseloides cryptus</i> Zimmer, 1945] | |
| [<i>Cypseloides lemosi</i> Eisenmann & Lehmann, 1962] | |
| <i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848) | taperuçu-preto |
| <i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826) | taperuçu-velho |
| <i>Streptoprocne phelpsi</i> (Collins, 1972) | taperuçu-dos-tepui |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796) | taperuçu-de-coleira-branca |
| <i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866) | taperuçu-de-coleira-falha |
| <i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839) | andorinhão-de-sobre-branco |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862 | andorinhão-de-sobre-cinzentos |
| <i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916 | taperá-de-garganta-branca |
| [<i>Chaetura pelagica</i> (Linnaeus, 1758)] | |
| <i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907 | andorinhão-de-chapman |
| <i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916 | andorinhão-da-amazônia |
| <i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907 | andorinhão-do-temporal |
| <i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846) | andorinhão-de-rabo-curto |
| <i>Aeronautes montivagus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | andorinhão-serrano |
| <i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853) | tesourinha |
| <i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789) | andorinhão-estofador |
| TROCHILIDAE Vigors, 1825 | |
| PHAETHORNITHINAE Jardine, 1833 | |
| <i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818) | beija-flor-rajado |
| <i>Glaucis dohrnii</i> (Bourcier & Mulsant, 1852) | balança-rabo-canela |
| <i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788) | balança-rabo-de-bico-torto |
| <i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766) | balança-rabo-de-garganta-preta |
| <i>Threnetes niger</i> (Linnaeus, 1758) | balança-rabo-escuro |
| <i>Anopetia gounellei</i> (Boucard, 1891) | rabo-branco-de-cauda-larga |
| <i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822) | rabo-branco-pequeno |
| <i>Phaethornis maranhaoensis</i> Grantsau, 1968 | rabo-branco-do-maranhão |
| <i>Phaethornis rupurumii</i> Boucard, 1892 | rabo-branco-do-rupununi |
| <i>Phaethornis aethopyga</i> Zimmer, 1950 | rabo-branco-de-garganta-escuro |
| <i>Phaethornis idaliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1856) | rabo-branco-mirim |
| <i>Phaethornis nattereri</i> Berlepsch, 1887 | besourão-de-sobre-amarelo |
| <i>Phaethornis griseogularis</i> Gould, 1851 | rabo-branco-de-garganta-cinza |
| <i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) | rabo-branco-rubro |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|--------------------------------|
| <i>Phaethornis subochraceus</i> Todd, 1915 | rabo-branco-de-barriga-fulva |
| <i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839) | rabo-branco-acanelado |
| <i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832) | rabo-branco-de-garganta-rajada |
| <i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846) | rabo-branco-cinza |
| <i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847) | rabo-branco-amarelo |
| <i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) | rabo-branco-de-bico-reto |
| <i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) | rabo-branco-de-bigodes |
| <i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835) | besourão-de-bico-grande |
| <i>Phaethornis margarettae</i> Ruschi, 1972 | rabo-branco-de-margarette |
| TROCHILINAE Vigors, 1825 | |
| <i>Doryfera johannae</i> (Bourcier, 1847) | bico-de-lança |
| <i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783) | asa-de-sabre-cinza |
| <i>Campylopterus hyperythrus</i> Cabanis, 1848 | asa-de-sabre-canela |
| <i>Campylopterus duidae</i> Chapman, 1929 | asa-de-sabre-de-peito-camurça |
| <i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-tesoura |
| <i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-cinza |
| <i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758) | beija-flor-azul-de-rabo-branco |
| <i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817) | beija-flor-preto |
| <i>Colibri delphinae</i> (Lesson, 1839) | beija-flor-marrom |
| <i>Colibri coruscans</i> (Gould, 1846) | beija-flor-violeta |
| <i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816) | beija-flor-de-orelha-violeta |
| <i>Anthracothorax viridigula</i> (Boddaert, 1783) | beija-flor-de-veste-verde |
| <i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817) | beija-flor-de-veste-preta |
| <i>Avocettula recurvirostris</i> (Swainson, 1822) | beija-flor-de-bico-virado |
| <i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758) | beija-flor-brilho-de-fogo |
| <i>Topaza pyra</i> (Gould, 1846) | topázio-de-fogo |
| <i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758) | beija-flor-vermelho |
| <i>Stephanoxis lalandi</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-de-topete |
| <i>Lophornis ornatus</i> (Boddaert, 1783) | beija-flor-de-leque-canela |
| <i>Lophornis gouldii</i> (Lesson, 1833) | topetinho-do-brasil-central |
| <i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817) | topetinho-vermelho |
| <i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1823) | topetinho-verde |
| <i>Lophornis pavoninus</i> Salvin, & Godman, 1882 | topetinho-pavão |
| <i>Discosura langsdorffi</i> (Temminck, 1821) | rabo-de-espinho |
| <i>Discosura longicaudus</i> (Gmelin, 1788) | bandeirinha |
| <i>Chlorestes notata</i> (Reich, 1793) | beija-flor-de-garganta-azul |
| <i>Chlorostilbon mellisugus</i> (Linnaeus, 1758) | esmeralda-de-cauda-azul |
| <i>Chlorostilbon aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) | besourinho-de-bico-vermelho |
| <i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-tesoura-verde |
| <i>Thalurania watertonii</i> (Bourcier, 1847) | beija-flor-de-costas-violetas |
| <i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-de-fronte-violeta |
| <i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-safira |
| <i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-roxo |
| <i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812) | beija-flor-dourado |
| <i>Chrysuronia oenone</i> (Lesson, 1832) | beija-flor-de-cauda-dourada |
| <i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-de-papo-branco |
| <i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764) | beija-flor-de-bico-curvo |
| <i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843) | beija-flor-dos-tepuis |
| <i>Leucippus chlorocercus</i> Gould, 1866 | beija-flor-verde |
| <i>Amazilia chionogaster</i> (Tschudi, 1845) | beija-flor-verde-e-branco |
| <i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-de-barriga-branca |
| <i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-de-banda-branca |
| <i>Amazilia rondoniae</i> Ruschi, 1982 | beija-flor-de-cabeça-azul |
| <i>Amazilia brevirostris</i> (Lesson, 1829) | beija-flor-de-bico-preto |
| <i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-de-garganta-verde |
| <i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832) | beija-flor-de-peito-azul |
| <i>Amazilia viridigaster</i> (Bourcier, 1843) | beija-flor-de-barriga-verde |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|-----------------------------------|
| <i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783) | beija-flor-rubi |
| <i>Heliodoxa xanthogonys</i> Salvin & Godman, 1882 | brilhante-veludo |
| <i>Heliodoxa schreibersii</i> (Bourcier, 1847) | brilhante-de-garganta-preta |
| <i>Heliodoxa aurescens</i> (Gould, 1846) | beija-flor-estrela |
| <i>Augastes scutatus</i> (Temminck, 1824) | beija-flor-de-gravata-verde |
| <i>Augastes lumachella</i> (Lesson, 1838) | beija-flor-de-gravata-vermelha |
| <i>Heliiothryx auritus</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-de-bochecha-azul |
| <i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820) | chifre-de-ouro |
| <i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801) | bico-reto-cinzento |
| <i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823) | bico-reto-de-banda-branca |
| <i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812) | bico-reto-azul |
| <i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783) | estrelinha-ametista |
| TROGONIFORMES A. O. U., 1886 | |
| TROGONIDAE Lesson, 1828 | |
| <i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 | surucuá-grande-de-barriga-amarela |
| <i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817 | surucuá-variado |
| <i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766 | surucuá-de-barriga-vermelha |
| <i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 | surucuá-pequeno |
| <i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817 | surucuá-de-coleira |
| <i>Trogon personatus</i> Gould, 1842 | surucuá-mascarado |
| <i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 | surucuá-de-barriga-amarela |
| <i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 | surucuá-de-cauda-preta |
| <i>Pharomachrus pavoninus</i> (Spix, 1824) | surucuá-pavão |
| CORACIIFORMES Forbes, 1844 | |
| ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766) | martim-pescador-grande |
| <i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790) | martim-pescador-verde |
| <i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788) | martim-pescador-pequeno |
| <i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766) | martim-pescador-da-mata |
| <i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764) | martinho |
| MOMOTIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829) | udu-de-bico-largo |
| <i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824) | juruva-ruiva |
| <i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818) | juruva-verde |
| <i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) | udu-de-coroa-azul |
| GALBULIFORMES Fürbringer, 1888 | |
| GALBULIDAE Vigors, 1825 | |
| <i>Galbalcyrhynchus leucotis</i> Des Murs, 1845 | ariramba-vermelha |
| <i>Galbalcyrhynchus purusianus</i> Goeldi, 1904 | sovela-vermelha |
| <i>Brachygalba albogularis</i> (Spix, 1824) | agulha-de-garganta-branca |
| <i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838) | ariramba-preta |
| <i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Vieillot, 1817) | cuitelão |
| <i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 | ariramba-de-bico-amarelo |
| <i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851 | ariramba-da-mata |
| <i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816 | ariramba-de-cauda-ruiva |
| <i>Galbula galbula</i> (Linnaeus, 1766) | ariramba-de-cauda-verde |
| <i>Galbula tombacea</i> Spix, 1824 | ariramba-de-barba-branca |
| <i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849 | ariramba-da-capoeira |
| <i>Galbula chalcothorax</i> Sclater, 1854 | ariramba-violácea |
| <i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817 | ariramba-bronzeada |
| <i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) | ariramba-do-paráíso |
| <i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776) | jacamarauçu |
| BUCCONIDAE Horsfield, 1821 | |
| <i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788) | macuru-de-testa-branca |
| <i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856) | macuru-de-pescoço-branco |
| <i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846) | macuru-de-barriga-castanha |
| <i>Notharchus ordii</i> (Cassin, 1851) | macuru-de-peito-marrom |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|----------------------------------|
| <i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783) | macuru-pintado |
| <i>Bucco macrodactylus</i> (Spix, 1824) | rapazinho-de-boné-vermelho |
| <i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788 | rapazinho-carijó |
| <i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 | rapazinho-de-colar |
| <i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856) | rapazinho-estriado |
| <i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816) | joão-bobo |
| <i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788) | rapazinho-dos-velhos |
| <i>Nystalus striatipectus</i> (Sclater, 1854) | rapazinho-do-chaco |
| <i>Malacoptila fusca</i> (Gmelin, 1788) | barbudo-pardo |
| <i>Malacoptila semicincta</i> Todd, 1925 | barbudo-de-coleira |
| <i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824) | barbudo-rajado |
| <i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824) | barbudo-de-pescoço-ferrugem |
| <i>Micromonacha lanceolata</i> (Deville, 1849) | macuru-papa-mosca |
| <i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824) | macuru |
| <i>Nonnula sclateri</i> Hellmayr, 1907 | freirinha-amarelada |
| <i>Nonnula ruficapilla</i> (Tschudi, 1844) | freirinha-de-coroa-castanha |
| <i>Nonnula amaurocephala</i> Chapman, 1921 | freirinha-de-cabeça-castanha |
| <i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1783) | chora-chuva-de-asa-branca |
| <i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824) | chora-chuva-preto |
| <i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823) | chora-chuva-de-cara-branca |
| <i>Monasa flavirostris</i> Strickland, 1850 | chora-chuva-de-bico-amarelo |
| <i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782) | urubuzinho |
| PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810 | |
| CAPITONIDAE Bonaparte, 1838 | |
| <i>Capito aurovirens</i> (Cuvier, 1829) | capitão-de-coroa |
| <i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916 | capitão-de-cinta |
| <i>Capito brunneipectus</i> Chapman, 1921 | capitão-de-peito-marrom |
| <i>Capito niger</i> (Statius Muller, 1776) | capitão-de-bigode-carijó |
| <i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816) | capitão-de-fronte-dourada |
| <i>Eubucco richardsoni</i> (Gray, 1846) | capitão-de-bigode-limão |
| <i>Eubucco tucinkae</i> (Seilern, 1913) | capitão-de-colar-amarelo |
| RAMPHASTIDAE Vigors, 1825 | |
| <i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776 | tucanuçu |
| <i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1778 | tucano-grande-de-papo-branco |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 | tucano-de-bico-preto |
| <i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766 | tucano-de-bico-verde |
| <i>Aulacorhynchus prasinus</i> (Gould, 1834) | tucaninho-de-nariz-amarelo |
| <i>Aulacorhynchus derbianus</i> Gould, 1835 | tucaninho-verde |
| <i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) | araçari-negro |
| <i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827) | saripoca-de-coleira |
| <i>Selenidera nattereri</i> (Gould, 1836) | saripoca-de-bico-castanho |
| <i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837) | saripoca-de-gould |
| <i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823) | araçari-poca |
| <i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819) | araçari-banana |
| <i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) | araçari-miudinho |
| <i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822 | araçari-miudinho-de-bico-riscado |
| <i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826 | araçari-de-pescoço-vermelho |
| <i>Pteroglossus azara</i> (Vieillot, 1819) | araçari-de-bico-de-marfim |
| <i>Pteroglossus mariae</i> Gould, 1854 | araçari-de-bico-marrom |
| <i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758) | araçari-de-bico-branco |
| <i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834 | araçari-castanho |
| <i>Pteroglossus pluricinctus</i> Gould, 1835 | araçari-de-cinta-dupla |
| <i>Pteroglossus beauharnaesii</i> Wagler, 1832 | araçari-mulato |
| PICIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870 | pica-pau-anão-dourado |
| <i>Picumnus pumilus</i> Cabanis & Heine, 1863 | pica-pau-anão-do-orinoco |
| <i>Picumnus lafresnayi</i> Malherbe, 1862 | pica-pau-anão-do-amazonas |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|----------------------------------|
| <i>Picumnus exilis</i> (Lichtenstein, 1823) | pica-pau-anão-de-pintas-amarelas |
| <i>Picumnus spilogaster</i> Sundevall, 1866 | pica-pau-anão-de-pescoço-branco |
| <i>Picumnus pygmaeus</i> (Lichtenstein, 1823) | pica-pau-anão-pintado |
| <i>Picumnus varzeae</i> Snethlage, 1912 | pica-pau-anão-da-várzea |
| <i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825 | pica-pau-anão-barrado |
| <i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845 | pica-pau-anão-de-coleira |
| <i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840 | pica-pau-anão-escamado |
| <i>Picumnus fuscus</i> Pelzeln, 1870 | pica-pau-anão-fusco |
| <i>Picumnus rufiventris</i> Bonaparte, 1838 | pica-pau-anão-vermelho |
| <i>Picumnus fulvescens</i> Stager, 1961 | pica-pau-anão-canela |
| <i>Picumnus limae</i> Snethlage, 1924 | pica-pau-anão-da-caatinga |
| <i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866 | pica-pau-anão-carijó |
| <i>Picumnus castelnau</i> Malherbe, 1862 | pica-pau-anão-creme |
| <i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796) | birro, pica-pau-branco |
| <i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783) | benedito-de-testa-vermelha |
| <i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818) | benedito-de-testa-amarela |
| <i>Melanerpes cactorum</i> (d'Orbigny, 1840) | pica-pau-de-testa-branca |
| <i>Picoides mixtus</i> (Boddaert, 1783) | pica-pau-chorão |
| <i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766) | picapauzinho-anão |
| <i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827) | picapauzinho-verde-carijó |
| <i>Veniliornis kirkii</i> (Malherbe, 1845) | pica-pau-de-sobre-vermelho |
| <i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821) | picapauzinho-avermelhado |
| <i>Veniliornis cassini</i> (Malherbe, 1862) | pica-pau-de-colar-dourado |
| <i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824) | picapauzinho-de-testa-pintada |
| <i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) | pica-pau-de-garganta-branca |
| <i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) | pica-pau-bufador |
| <i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) | pica-pau-dourado-escuro |
| <i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821) | pica-pau-dourado |
| <i>Piculus rubiginosus</i> (Swainson, 1820) | pica-pau-oliváceo |
| <i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783) | pica-pau-de-peito-pontilhado |
| <i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788) | pica-pau-verde-barrado |
| <i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818) | pica-pau-do-campo |
| <i>Celeus undatus</i> (Linnaeus, 1766) | pica-pau-barrado |
| <i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) | picapauzinho-chocolate |
| <i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776) | pica-pau-chocolate |
| <i>Celeus lugubris</i> (Malherbe, 1851) | pica-pau-louro |
| <i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788) | pica-pau-de-cabeça-amarela |
| <i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776) | pica-pau-amarelo |
| <i>Celeus spectabilis</i> Sclater & Salvin, 1880 | pica-pau-lindo |
| <i>Celeus obrieni</i> Short, 1973 | pica-pau-do-parnaíba |
| <i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) | pica-pau-de-coleira |
| <i>Dryocopus galeatus</i> (Temminck, 1822) | pica-pau-de-cara-canela |
| <i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) | pica-pau-de-banda-branca |
| <i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783) | pica-pau-de-barriga-vermelha |
| <i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818) | pica-pau-rei |
| <i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788) | pica-pau-de-topete-vermelho |
| <i>Campephilus leucopogon</i> (Valenciennes, 1826) | pica-pau-de-barriga-preta |
| PASSERIFORMES Linné, 1758 | |
| TYRANNI Wetmore & Miller, 1926 | |
| FURNARIIDA Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988 | |
| MELANOPAREIIDAE Irestedt, Fjeldså, Johansson & Ericson, 2002 | |
| <i>Melanopareia torquata</i> (Wied, 1831) | tapaculo-de-colarinho |
| THAMNOPHILOIDEA Swainson, 1824 | |
| THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824 | |
| <i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) | papa-formiga-barrado |
| <i>Cymbilaimus sanctaemariae</i> Gyldenstolpe, 1941 | choca-do-bambu |
| <i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816) | chocão-carijó |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|--------------------------------|
| <i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819) | matracão |
| <i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825) | borralhara-assobiadora |
| <i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823) | borralhara |
| <i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816) | borralhara-do-norte |
| <i>Frederickena unduligera</i> (Pelzeln, 1868) | borralhara-ondulada |
| <i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816) | chorá-boi |
| <i>Sakesphorus canadensis</i> (Linnaeus, 1766) | choca-de-crista-preta |
| <i>Sakesphorus cristatus</i> (Wied, 1831) | choca-do-nordeste |
| <i>Sakesphorus melanothorax</i> (Sclater, 1857) | choca-de-cauda-pintada |
| <i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823) | choca-d'água |
| <i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850) | papo-branco |
| <i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764) | choca-barrada |
| <i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823) | choca-listrada |
| <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> Sclater, 1855 | choca-preta-e-cinza |
| <i>Thamnophilus cryptoleucus</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906) | choca-selada |
| <i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858 | choca-lisa |
| <i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835 | choca-de-oho-vermelho |
| <i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868 | choca-murina |
| <i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809) | choca-bate-cabo |
| <i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868 | choca-de-natterer |
| <i>Thamnophilus sticturus</i> Pelzeln, 1868 | choca-da-bolívia |
| <i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924 | choca-do-planalto |
| <i>Thamnophilus ambiguus</i> Swainson, 1825 | choca-de-sooretama |
| <i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858 | choca-canela |
| <i>Thamnophilus divisorius</i> Whitney, Oren & Brumfield, 2004 | choca-do-acre |
| <i>Thamnophilus insignis</i> Salvin & Godman, 1884 | choca-de-roraima |
| <i>Thamnophilus caeruleus</i> Vieillot, 1816 | choca-da-mata |
| <i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825 | choca-de-asa-vermelha |
| <i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816 | choca-de-chapéu-vermelho |
| <i>Megastictus margaritatus</i> (Sclater, 1855) | choca-pintada |
| <i>Neotantes niger</i> (Pelzeln, 1859) | choca-preta |
| <i>Clytactantes atrogularis</i> Lanyon, Stotz & Willard, 1991 | choca-de-garganta-preta |
| <i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823) | choquinha-de-peito-pintado |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823) | choquinha-lisa |
| <i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856 | choquinha-de-asa-ferrugem |
| <i>Dysithamnus plumbeus</i> (Wied, 1831) | choquinha-chumbo |
| <i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1867) | uirapuru-de-garganta-preta |
| <i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878) | uirapuru-selado |
| <i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) | ipeçuá |
| <i>Thamnomanes schistogynus</i> Hellmayr, 1911 | uirapuru-azul |
| <i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825) | choca-cantadora |
| <i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 | choquinha-de-barriga-parda |
| <i>Myrmotherula leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868) | choquinha-de-olho-branco |
| <i>Myrmotherula haematonota</i> (Sclater, 1857) | choquinha-de-garganta-carijó |
| <i>Myrmotherula ornata</i> Sclater, 1853 | choquinha-ornada |
| <i>Myrmotherula erythrura</i> Sclater, 1890 | choquinha-de-cauda-ruiva |
| <i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) | choquinha-miúda |
| <i>Myrmotherula ignota</i> Griscom, 1929 | choquinha-de-bico-curto |
| <i>Myrmotherula ambigua</i> Zimmer, 1932 | choquinha-de-coroa-listrada |
| <i>Myrmotherula sclateri</i> Sneath, 1912 | choquinha-de-garganta-amarela |
| <i>Myrmotherula surinamensis</i> (Gmelin, 1788) | choquinha-estriada |
| <i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858 | choquinha-estriada-da-amazônia |
| <i>Myrmotherula cherriei</i> Berlepsch & Hartert, 1902 | choquinha-de-peito-riscado |
| <i>Myrmotherula klagesi</i> Todd, 1927 | choquinha-do-tapajós |
| <i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857) | choquinha-de-garganta-clara |
| <i>Myrmotherula guttata</i> (Vieillot, 1825) | choquinha-de-barriga-ruiva |
| <i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825) | choquinha-de-garganta-pintada |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|--------------------------------|
| <i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) | choquinha-de-flanco-branco |
| <i>Myrmotherula sunensis</i> Chapman, 1925 | choquinha-do-oeste |
| <i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864 | choquinha-pequena |
| <i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868 | choquinha-de-asa-comprida |
| <i>Myrmotherula urosticta</i> (Sclater, 1857) | choquinha-de-rabo-cintado |
| <i>Myrmotherula iheringi</i> Snethlage, 1914 | choquinha-de-ihering |
| <i>Myrmotherula fluminensis</i> Gonzaga, 1988 | choquinha-fluminense |
| <i>Myrmotherula unicolor</i> (Menetries, 1835) | choquinha-cinzenta |
| <i>Myrmotherula snowi</i> Teixeira & Gonzaga, 1985 | choquinha-de-alagoas |
| <i>Myrmotherula behni</i> Berlepsch & Leverkuhn, 1890 | choquinha-de-asa-lisa |
| <i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) | choquinha-de-garganta-cinza |
| <i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868 | choquinha-da-várzea |
| <i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868) | tovaquinha |
| <i>Myrmorchilus strigilatus</i> (Wied, 1831) | piu-piu |
| <i>Herpsilochmus sellowi</i> Whitney & Pacheco, 2000 | chorozinho-da-caatinga |
| <i>Herpsilochmus pileatus</i> (Lichtenstein, 1823) | corozinho-de-boné |
| <i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868 | chorozinho-de-chapéu-preto |
| <i>Herpsilochmus sticturus</i> Salvin, 1885 | chorozinho-de-cauda-pintada |
| <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 | chorozinho-de-cabeça-pintada |
| <i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 | chorozinho-de-costas-manchadas |
| <i>Herpsilochmus roraimae</i> Hellmayr, 1903 | chorozinho-de-roraima |
| <i>Herpsilochmus pectoralis</i> Sclater, 1857 | chorozinho-de-papo-preto |
| <i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868 | chorozinho-de-bico-comprido |
| <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822) | chorozinho-de-asa-vermelha |
| <i>Microrhopias quixensis</i> (Cornalia, 1849) | papa-formiga-de-bando |
| <i>Formicivora iheringi</i> Hellmayr, 1909 | formigueiro-do-nordeste |
| <i>Formicivora erythronotos</i> Hartlaub, 1852 | formigueiro-de-cabeça-negra |
| <i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783) | papa-formiga-pardo |
| <i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929 | formigueiro-da-serra |
| <i>Formicivora littoralis</i> Gonzaga & Pacheco, 1990 | formigueiro-do-litoral |
| <i>Formicivora melanogaster</i> Pelzeln, 1868 | formigueiro-de-barriga-preta |
| <i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831) | papa-formiga-vermelho |
| <i>Stymphalornis acutirostris</i> Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995 | bicudinho-do-brejo |
| <i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822) | trovoada |
| <i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901) | trovoada-de-bertoni |
| <i>Drymophila genei</i> (Filippi, 1847) | choquinha-da-serra |
| <i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906) | choquinha-de-dorso-vermelho |
| <i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825) | choquinha-carijó |
| <i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823) | pintadinho |
| <i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906) | trovoada-listrada |
| <i>Terenura sicki</i> Teixeira & Gonzaga, 1983 | zididê-do-nordeste |
| <i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831) | zidedê |
| <i>Terenura humeralis</i> Sclater & Salvin, 1880 | zidedê-de-encontro |
| <i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881 | zidedê-de-asa-cinza |
| <i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) | chororó-pocuí |
| <i>Cercomacra brasiliiana</i> Hellmayr, 1905 | chororó-cinzento |
| <i>Cercomacra tyrannina</i> (Sclater, 1855) | chororá-escuro |
| <i>Cercomacra laeta</i> Todd, 1920 | chororó-didi |
| <i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859) | chororó-negro |
| <i>Cercomacra serva</i> Sclater, 1858 () | chororó-preto |
| <i>Cercomacra carbonaria</i> Sclater & Salvin, 1873 | chororó-do-rio-branco |
| <i>Cercomacra melanaria</i> (Menetries, 1835) | chororó-do-pantanal |
| <i>Cercomacra manu</i> Fitzpatrick & Willard, 1990 | chororó-de-manu |
| <i>Cercomacra ferdinandi</i> Snethlage, 1928 | chororó-de-goíás |
| <i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824) | papa-taoca |
| <i>Pyriglena atra</i> (Swainson, 1825) | papa-taoca-da-bahia |
| <i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818) | papa-taoca-do-sul |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-----------------------------------|
| <i>Rhopornis ardesiacus</i> (Wied, 1831) | gravatazeiro |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844) | papa-formiga-de-sobrancelha |
| <i>Myrmoborus lugubris</i> (Cabanis, 1847) | formigueiro-liso |
| <i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825) | formigueiro-de-cara-preta |
| [<i>Myrmoborus melanurus</i> (Sclater & Salvin, 1866)] | |
| <i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) | papa-formiga-cantador |
| <i>Hypocnemis hypoxantha</i> Sclater, 1869 | cantador-amarelo |
| <i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868) | solta-asa |
| <i>Hypocnemoides melanopogon</i> (Sclater, 1857) | solta-asa-do-norte |
| <i>Myrmochanes hemileucus</i> (Sclater & Salvin, 1866) | formigueiro-preto-e-branco |
| <i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788) | papa-formiga-do-igarapé |
| <i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) | formigueiro-de-cabeça-preta |
| <i>Percnostola minor</i> Pelzeln, 1868 | formigueiro-de-pelzeln |
| <i>Percnostola lophotes</i> Hellmayr & Seilern, 1914 | formigueiro-do-bambu |
| <i>Schistocichla schistacea</i> (Sclater, 1858) | formigueiro-cinza |
| <i>Schistocichla leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) | formigueiro-de-asa-pintada |
| <i>Schistocichla caurensis</i> (Hellmayr, 1906) | formigueiro-do-caura |
| <i>Myrmeciza longipes</i> (Swainson, 1825) | formigueiro-de-barriga-branca |
| <i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Muller, 1776) | formigueiro-ferrugem |
| <i>Myrmeciza ruficauda</i> (Wied, 1831) | formigueiro-de-cauda-ruiva |
| <i>Myrmeciza loricata</i> (Lichtenstein, 1823) | formigueiro-assobiador |
| <i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868 | papa-formiga-de-grota |
| <i>Myrmeciza pelzelni</i> Sclater, 1890 | formigueiro-de-barriga-cinza |
| <i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857 | formigueiro-de-cauda-castanha |
| <i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783) | formigueiro-de-peito-preto |
| <i>Myrmeciza melanocephala</i> (Spix, 1825) | formigueiro-grande |
| <i>Myrmeciza goeldii</i> (Snethlage, 1908) | formigueiro-de-goeldi |
| <i>Myrmeciza hyperythra</i> (Sclater, 1855) | formigueiro-chumbo |
| <i>Myrmeciza fortis</i> (Sclater & Salvin, 1868) | formigueiro-de-taoca |
| <i>Myrmeciza disjuncta</i> Friedmann, 1945 | formigueiro-de-yapacana |
| <i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783) | pinto-do-mato-carijó |
| <i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) | papa-formiga-de-topete |
| <i>Gymnopathys leucaspis</i> (Sclater, 1855) | mãe-de-taoca-bochechuda |
| <i>Gymnopathys rufigula</i> (Boddaert, 1783) | mãe-de-taoca-de-garganta-vermelha |
| <i>Gymnopathys salvini</i> (Berlepsch, 1901) | mãe-de-taoca-de-cauda-barrada |
| <i>Rhegmatorhina gymnops</i> Ridgway, 1888 | mãe-de-taoca-de-cara-branca |
| <i>Rhegmatorhina berlepschi</i> (Snethlage, 1907) | mãe-de-taoca-arlequim |
| <i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907) | mãe-de-taoca-papuda |
| <i>Rhegmatorhina cristata</i> (Pelzeln, 1868) | mãe-de-taoca-cristada |
| <i>Rhegmatorhina melanosticta</i> (Sclater & Salvin, 1880) | mãe-de-taoca-cabeçuda |
| <i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789) | guarda-floresta |
| <i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856) | guarda-várzea |
| <i>Hylophylax poecilnotus</i> (Cabanis, 1847) | rendadinho |
| <i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | mãe-de-taoca |
| <i>Phlegopsis erythroptera</i> (Gould, 1855) | mãe-de-taoca-avermelhada |
| <i>Skutchia borbae</i> (Hellmayr, 1907) | mãe-de-taoca-dourada |
| CONOPOPHAGIDAE Sclater & Salvin, 1873 | |
| <i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831) | chupa-dente |
| <i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789) | chupa-dente-de-cinta |
| <i>Conopophaga roberti</i> Hellmayr, 1905 | chupa-dente-de-capuz |
| <i>Conopophaga melanogaster</i> Menetries, 1835 | chupa-dente-grande |
| <i>Conopophaga peruviana</i> Des Murs, 1856 | chupa-dente-do-peru |
| <i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818) | cuspidor-de-máscara-preta |
| FURNARIOIDEA Gray, 1840 | |
| GRALLARIIDAE Sclater & Salvin, 1873 | |
| <i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) | tovacuçu |
| <i>Grallaria eludens</i> Lowery & O'Neill, 1969 | tovacuçu-xodó |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|------------------------------|
| <i>Hylopezus macularius</i> (Temminck, 1823) | torom-carijó |
| <i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903) | torom-torom |
| <i>Hylopezus ochroleucus</i> (Wied, 1831) | torom-do-nordeste |
| <i>Hylopezus nattereri</i> Pinto, 1937 | pinto-do-mato |
| <i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783) | tovaca-patinho |
| <i>Myrmothera simplex</i> (Salvin & Godman, 1884) | torom-de-peito-pardo |
| RHINOCRYPTIDAE Wetmore, 1930 | |
| <i>Liosceles thoracicus</i> (Sclater, 1865) | corneteiro-da-mata |
| <i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétriès, 1835) | tapaculo-pintado |
| <i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830 | entufado |
| <i>Merulaxis stresemanni</i> Sick, 1960 | entufado-baiano |
| <i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétriès, 1835) | tapaculo-preto |
| <i>Scytalopus iraiensis</i> Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998 | macuquinho-da-várzea |
| <i>Scytalopus novacapitalis</i> Sick, 1958 | tapaculo-de-brasília |
| <i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831) | macuquinho |
| <i>Scytalopus psychopompus</i> Teixeira & Carnevalli, 1989 | macuquinho-baiano |
| FORMICARIIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 | galinha-do-mato |
| <i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | pinto-do-mato-de-cara-preta |
| <i>Formicarius rufifrons</i> Blake, 1957 | pinto-domato-de-fronte-ruiva |
| <i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823) | tovaca-campainha |
| <i>Chamaeza nobilis</i> Gould, 1855 | tovaca-estriada |
| <i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825 | tovaca-cantadora |
| <i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis & Heine, 1859) | tovaca-de-rabo-vermelho |
| SCLERURIDAE Swainson, 1827 | |
| <i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857 | vira-folha-de-peito-vermelho |
| <i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1868 | vira-folha-de-bico-curto |
| <i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816) | vira-folha-pardo |
| <i>Sclerurus albigularis</i> Sclater & Salvin, 1869 | vira-folha-de-garganta-cinza |
| <i>Sclerurus scansor</i> (Menetries, 1835) | vira-folha |
| <i>Geositta poeciloptera</i> (Wied, 1830) | andarilho |
| <i>Geositta cunicularia</i> (Vieillot, 1816) | curriqueiro |
| DENDROCOLAPTIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-pardo |
| <i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820) | arapaçu-liso |
| <i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829) | arapaçu-da-taoca |
| <i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) | arapaçu-rabudo |
| <i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868) | arapaçu-de-garganta-pintada |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-verde |
| <i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) | arapaçu-de-bico-de-cunha |
| <i>Drymornis bridgesii</i> (Eyton, 1850) | arapaçu-platino |
| <i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-de-bico-comprido |
| <i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844) | arapaçu-galinha |
| <i>Hylexetastes stresemanni</i> Sneathlaga, 1825 | arapaçu-de-barriga-pintada |
| <i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) | arapaçu-de-bico-vermelho |
| <i>Hylexetastes uniformis</i> Hellmayr, 1909 | arapaçu-uniforme |
| <i>Hylexetastes brigidai</i> Silva, Novaes & Oren, 1996 | arapaçu-deloro-cinza |
| <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840) | arapaçu-vermelho |
| <i>Xiphocolaptes carajaensis</i> Silva, Novaes & Oren, 2002 | arapaçu-do-carajás |
| <i>Xiphocolaptes falcirostris</i> (Spix, 1824) | arapaçu-do-nordeste |
| <i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-de-garganta-branca |
| <i>Xiphocolaptes major</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-do-campo |
| <i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) | arapaçu-barrado |
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820 | arapaçu-meio-barrado |
| <i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i> Hellmayr, 1909 | arapaçu-marrom |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825 | arapaçu-grande |
| <i>Xiphorhynchus picus</i> (Gmelin, 1788) | arapaçu-de-bico-branco |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-----------------------------|
| <i>Xiphorhynchus kienerii</i> (Des Murs, 1855) | arapaçu-ferrugem |
| <i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-rajado |
| <i>Xiphorhynchus ocellatus</i> (Spix, 1824) | arapaçu-ocelado |
| <i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-assobiador |
| <i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868) | arapaçu-elegante |
| <i>Xiphorhynchus spixii</i> (Lesson, 1830) | arapaçu-de-spix |
| <i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820) | arapaçu-riscado |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820) | arapaçu-de-garganta-amarela |
| <i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (Des Murs, 1849) | arapaçu-listrado |
| <i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818) | arapaçu-de-cerrado |
| <i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822) | arapaçu-escamado |
| <i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859) | arapaçu-escamado-do-sul |
| <i>Lepidocolaptes wagleri</i> (Spix, 1824) | arapaçu-de-wagler |
| <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845) | arapaçu-de-listras-brancas |
| <i>Campylorhamphus trochilirostris</i> (Lichtenstein, 1820) | arapaçu-beija-flor |
| <i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822) | arapaçu-de-bico-torto |
| <i>Campylorhamphus procurvoides</i> (Lafresnaye, 1850) | arapaçu-de-bico-curvo |
| FURNARIIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Cinclodes fuscus</i> (Vieillot, 1818) | pedreiro-dos-andes |
| <i>Cinclodes pabsti</i> Sick, 1969 | pedreiro |
| <i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823) | casaca-de-couro-da-lama |
| <i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838 | casaca-de-couro-amarelo |
| <i>Furnarius torridus</i> Sclater & Salvin, 1866 | joão-de-bico-pálido |
| <i>Furnarius minor</i> Pelzeln, 1858 | joãozinho |
| <i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788) | joão-de-barro |
| <i>Limnornis curvirostris</i> Gould, 1839 | junqueiro-de-bico-curvo |
| <i>Limnornis rectirostris</i> (Gould, 1839) | junqueiro-de-bico-reto |
| <i>Phleocryptes melanops</i> (Vieillot, 1817) | bate-bico |
| <i>Leptasthenura platensis</i> Reichenbach, 1853 | rabudinho |
| <i>Leptasthenura striolata</i> (Pelzeln, 1856) | grimpeirinho |
| <i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824) | grimpeiro |
| <i>Spartonoica maluroides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | boinha |
| <i>Oreophylax moreirae</i> (Miranda-Ribeiro, 1906) | garrincha-chorona |
| <i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817) | bichoita |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819 | pichororé |
| <i>Synallaxis cinerea</i> Wied, 1831 | joão-baiano |
| <i>Synallaxis infuscata</i> Pinto, 1950 | tatac |
| <i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823 | pi-puí |
| <i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859 | petrim |
| <i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823 | uí-pi |
| <i>Synallaxis albigularis</i> Sclater, 1858 | joão-de-peito-escuro |
| <i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856 | joão-teneném |
| <i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874 | joão-grilo |
| <i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823 | joão-teneném-castanho |
| <i>Synallaxis cherriei</i> Gyldenstolpe, 1930 | puruchém |
| <i>Synallaxis propinqua</i> Pelzeln, 1859 | joão-de-barriga-branca |
| <i>Synallaxis macconnelli</i> Chubb, 1919 | joão-escuro |
| <i>Synallaxis cabanisi</i> Berlepsch & Leverkuhn, 1890 | joão-do-norte |
| <i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789) | joão-teneném-becuá |
| <i>Synallaxis albilora</i> Pelzeln, 1856 | joão-do-pantanal |
| <i>Synallaxis simoni</i> Hellmayr, 1907 | joão-do-araguaia |
| <i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859 | estrelinha-preta |
| <i>Synallaxis kollari</i> Pelzeln, 1856 | joão-de-barba-grisalha |
| <i>Gyalophylax hellmayri</i> (Reiser, 1905) | joão-chique-chique |
| <i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856) | arredio-do-rio |
| <i>Cranioleuca vulpecula</i> (Sclater & Salvin, 1866) | arredio-de-peito-branco |
| <i>Cranioleuca sulphurifera</i> (Burmeister, 1869) | arredio-de-papo-manchado |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|--------------------------------|
| <i>Cranioleuca pyrrophia</i> (Vieillot, 1818) | arredio |
| <i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853) | arredio-oliváceo |
| <i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831) | arredio-pálido |
| <i>Cranioleuca semicinerea</i> (Reichenbach, 1853) | joão-de-cabeça-cinza |
| <i>Cranioleuca demissa</i> (Salvin & Godman, 1884) | joão-do-tepui |
| <i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) | joão-pintado |
| <i>Cranioleuca muelleri</i> (Hellmayr, 1911) | joão-escamoso |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788) | curutié |
| <i>Certhiaxis mustelinus</i> (Sclater, 1874) | joão-da-canarana |
| <i>Thripophaga macroura</i> (Wied, 1821) | rabo-amarelo |
| <i>Thripophaga fusciceps</i> Sclater, 1889 | joão-liso |
| <i>Asthenes hudsoni</i> (Sclater, 1874) | joão-platino |
| [<i>Asthenes pyrrohleuca</i> (Vieillot, 1817)] | |
| <i>Asthenes baeri</i> (Berlepsch, 1906) | lenheiro |
| <i>Asthenes luizae</i> Vielliard, 1990 | lenheiro-da-serra-do-cipó |
| <i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821) | joão-de-pau |
| <i>Phacellodomus striaticollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) | tio-tio |
| <i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817) | graveteiro |
| <i>Phacellodomus erythroptthalmus</i> (Wied, 1821) | joão-botina-da-mata |
| <i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858) | joão-botina-do-brejo |
| <i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (Pelzeln, 1859) | cisqueiro |
| <i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817) | cochicho |
| <i>Coryphistera alaudina</i> Burmeister, 1860 | corredor-crestudo |
| <i>Metopothrix aurantiaca</i> Sclater & Salvin, 1866 | joão-folheiro |
| <i>Acrobatornis fonsecai</i> Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996 | acrobata |
| <i>Roraimia adusta</i> (Salvin & Godman, 1884) | joão-de-roraima |
| <i>Pseudoseisura cristata</i> (Spix, 1824) | casaca-de-couro |
| <i>Pseudoseisura unirufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) | casaca-de-couro-da-caatinga |
| <i>Pseudoseisura lophotes</i> (Reichenbach, 1853) | coperete |
| <i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886) | limpa-folha-do-buriti |
| <i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823) | limpa-folha-miúdo |
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832) | trepador-quiete |
| <i>Simoxenops ucayalae</i> (Chapman, 1928) | limpa-folha-de-bico-virado |
| <i>Ancistrops strigilatus</i> (Spix, 1825) | limpa-folha-picanço |
| <i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824) | limpa-folha-riscado |
| <i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) | limpa-folha-de-cauda-ruiva |
| <i>Philydor erythrocercum</i> (Pelzeln, 1859) | limpa-folha-de-sobre-ruivo |
| <i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856) | limpa-folha-de-asa-castanha |
| <i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859 | limpa-folha-ocráceo |
| <i>Philydor novaesi</i> Teixeira & Gonzaga, 1983 | limpa-folha-do-nordeste |
| <i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821) | limpa-folha-coroado |
| <i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818) | limpa-folha-de-testa-baia |
| <i>Philydor pyrrohodes</i> (Cabanis, 1848) | limpa-folha-vermelho |
| <i>Philydor dimidiatum</i> (Pelzeln, 1859) | limpa-folha-do-brejo |
| <i>Anabazenops dorsalis</i> (Sclater & Salvin, 1880) | barranqueiro-de-topete |
| <i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816) | trepador-coleira |
| <i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830) | trepador-sobrancelha |
| <i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) | barranqueiro-camurça |
| <i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) | barranqueiro-pardo |
| <i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902 | barranqueiro-do-pará |
| <i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821) | barranqueiro-de-olho-branco |
| <i>Automolus melanopezus</i> (Sclater, 1858) | barranqueiro-escuro |
| <i>Automolus roraimae</i> Hellmayr, 1917 | barranqueiro-de-roraima |
| <i>Automolus rubiginosus</i> (Sclater, 1857) | barranqueiro-ferrugem |
| <i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859) | barranqueiro-de-coroa-castanha |
| <i>Hylocryptus rectirostris</i> (Wied, 1831) | fura-barreira |
| <i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823) | joão-porca |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|----------------------------|
| <i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885 | trepadorzinho |
| <i>Xenops milleri</i> (Chapman, 1914) | bico-virado-da-copa |
| <i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859 | bico-virado-fino |
| <i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788) | bico-virado-miúdo |
| <i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821 | bico-virado-carijó |
| <i>Megaxenops parnaguae</i> Reiser, 1905 | bico-virado-da-caatinga |
| TYRANNIDA Wetmore & Miller, 1926 | |
| TYRANNIDAE Vigors, 1825 | |
| PIPROMORPHINAE Bonaparte, 1853 | |
| <i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) | abre-asa |
| <i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) | abre-asa-da-mata |
| <i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846 | abre-asa-de-cabeça-cinza |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846 | cabeçudo |
| <i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844) | estalador-do-norte |
| <i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830) | estalador |
| <i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) | maria-fiteira |
| <i>Lophotriccus eulophotes</i> Todd, 1925 | maria-topetuda |
| <i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) | caga-sebinho-de-penacho |
| <i>Atalotriccus pilaris</i> (Cabanis, 1847) | maria-de-olho-claro |
| <i>Hemitriccus minor</i> (Snethlage, 1907) | maria-sebinha |
| <i>Hemitriccus flammulatus</i> Berlepsch, 1901 | maria-de-peito-machetado |
| <i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822) | olho-falso |
| <i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906) | catraca |
| <i>Hemitriccus josephinae</i> (Chubb, 1914) | maria-bicudinha |
| <i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) | maria-de-olho-branco |
| <i>Hemitriccus griseipectus</i> (Snethlage, 1907) | maria-de-barriga-branca |
| <i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831) | tiririzinho-do-mato |
| <i>Hemitriccus iohannis</i> (Snethlage, 1907) | maria-peruviana |
| <i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853) | sebinho-rajado-amarelo |
| <i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831) | tachuri-campinha |
| <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | sebinho-de-olho-de-ouro |
| <i>Hemitriccus inornatus</i> (Pelzeln, 1868) | maria-da-campina |
| <i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925) | maria-mirim |
| <i>Hemitriccus mirandae</i> (Snethlage, 1925) | maria-do-nordeste |
| <i>Hemitriccus kaempferi</i> (Zimmer, 1953) | maria-catarinense |
| <i>Hemitriccus furcatus</i> (Lafresnaye, 1846) | papa-moscas-estrela |
| <i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857) | maria-piçaga |
| <i>Poecilotriccus senex</i> (Pelzeln, 1868) | maria-do-madeira |
| <i>Poecilotriccus russatus</i> (Salvin & Godman, 1884) | ferreirinho-ferrugem |
| <i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846) | tororó |
| <i>Poecilotriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853) | ferreirinho-de-testa-parda |
| <i>Poecilotriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868) | ferreirinho-de-cara-parda |
| <i>Poecilotriccus sylvia</i> (Desmarest, 1806) | ferreirinho-da-capoeira |
| <i>Taeniotriccus andrei</i> (Berlepsch & Hartert, 1902) | maria-bonita |
| <i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806) | ferreirinho-estriado |
| <i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831) | teque-teque |
| <i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766) | ferreirinho-relógio |
| <i>Todirostrum pictum</i> Salvin, 1897 | ferreirinho-de-sobancelha |
| <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850 | ferreirinho-pintado |
| ELAENIINAE Cabanis & Heine, 1856 | |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859 | piolhinho-chiador |
| <i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824) | piolhinho-verdoso |
| <i>Phyllomyias reiseri</i> Hellmayr, 1905 | piolhinho-do-grotão |
| <i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822) | piolhinho |
| <i>Phyllomyias griseiceps</i> (Sclater & Salvin, 1871) | piolhinho-de-cabeça-cinza |
| <i>Phyllomyias griseocapilla</i> Sclater, 1862 | piolhinho-serrano |
| <i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) | maria-te-viu |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|---------------------------------|
| <i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839) | maria-pechim |
| <i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835) | guaracava-cinzenta |
| <i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887) | guaracava-de-penacho-amarelo |
| <i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817) | guaracava-de-crista-alaranjada |
| <i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822) | guaracava-de-barriga-amarela |
| <i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868 | guaracava-grande |
| <i>Elaenia ridleyana</i> Sharpe, 1888 | cocoruta |
| <i>Elaenia albiceps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | guaracava-de-crista-branca |
| <i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868 | guaracava-de-bico-curto |
| <i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830) | tuque |
| <i>Elaenia pelzelni</i> Berlepsch, 1907 | guaracava-do-rio |
| <i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868 | guaracava-de-topete-uniforme |
| <i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865 | chibum |
| <i>Elaenia ruficeps</i> Pelzeln, 1868 | guaracava-de-topete-vermelho |
| <i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | tucão |
| <i>Elaenia pallatangae</i> Sclater, 1862 | guaracava-serrana |
| <i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 | poiaeiro-de-sobrancelha |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824) | risadinha |
| <i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818) | suiriri-cinzento |
| <i>Suiriri islerorum</i> Zimmer, Whittaker & Oren, 2001 | suiriri-da-chapada |
| <i>Mecocerculus leucophrys</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | alegrinho-de-garganta-branca |
| <i>Serpophaga hypoleuca</i> Sclater & Salvin, 1866 | alegrio-do-rio |
| <i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817) | joão-pobre |
| <i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817) | alegrinho |
| <i>Serpophaga</i> sp. ["griseiceps" <i>sensu</i> Straneck, 1993] | alegrinho-trinador |
| <i>Serpophaga munda</i> Berlepsch, 1893 | alegrinho-de-barriga-branca |
| <i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825) | bageiro |
| <i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823) | marianinha-amarela |
| <i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817) | papa-moscas-canela |
| <i>Polystictus superciliaris</i> (Wied, 1831) | papa-moscas-de-costas-cinzentas |
| <i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892) | tricolino |
| <i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> (Sclater & Salvin, 1873) | tricolino-oliváceo |
| <i>Pseudocolopteryx dinelliana</i> Lillo, 1905 | tricolino-pardo |
| <i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> (d'Orbigny e Lafresnaye) | amarelinho-do-junco |
| <i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831 | barulhento |
| <i>Euscarthmus rufomarginatus</i> (Pelzeln, 1868) | maria-corruiá |
| <i>Stigmatura napensis</i> Chapman, 1926 | papa-moscas-do-sertão |
| <i>Stigmatura budytoides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | alegrinho-balança-rabo |
| <i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868) | poiaeiro-de-pata-fina |
| <i>Phylloscartes chapmani</i> Gilliard, 1940 | barbudinho-do-tepui |
| <i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822) | barbudinho |
| <i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824) | borboletinha-do-mato |
| <i>Phylloscartes ceciliae</i> Teixeira, 1987 | cara-pintada |
| <i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992 | maria-da-restinga |
| <i>Phylloscartes beckeri</i> Gonzaga & Pacheco, 1995 | borboletinha-baiana |
| <i>Phylloscartes virescens</i> Todd, 1925 | borboletinha-guianense |
| <i>Phylloscartes nigrifrons</i> (Salvin & Godman, 1884) | maria-de-testa-preta |
| <i>Phylloscartes roquettei</i> Sneathlage, 1928 | cara-dourada |
| <i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907 | não-pode-parar |
| <i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887) | papa-moscas-de-olheiras |
| <i>Phylloscartes difficilis</i> (Ihering & Ihering, 1907) | estalinho |
| <i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859) | maria-pequena |
| <i>Sublegatus obscurior</i> Todd, 1920 | sertanejo-escuro |
| <i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831) | guaracava-modesta |
| <i>Inezia inornata</i> (Salvadori, 1897) | alegrinho-do-chaco |
| <i>Inezia subflava</i> (Sclater & Salvin, 1873) | amarelinho |
| <i>Inezia caudata</i> (Salvin, 1897) | amarelinho-da-amazônia |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|----------------------------------|
| <i>Tachuris rubrigastra</i> (Vieillot, 1817) | papa-piri |
| <i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818) | papa-moscas-do-campo |
| <i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818) | miudinho |
| <i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | caçula |
| <i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860) | flautim-pardo |
| <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820) | bico-chato-grande |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825) | bico-chato-de-orelha-preta |
| <i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) | bico-chato-da-copa |
| <i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) | bico-chato-de-cabeça-cinza |
| <i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) | bico-chato-amarelo |
| <i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882 | patinho-escuro |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818 | patinho |
| <i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858 | patinho-de-coroa-dourada |
| <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788) | patinho-de-coroa-branca |
| <i>Platyrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831 | patinho-gigante |
| FLUVICOLINAE Swainson, 1832 | |
| <i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776) | maria-leque |
| <i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858) | maria-leque-do-sudeste |
| <i>Myiophobus roraimae</i> (Salvin & Godman, 1883) | felipe-do-tepui |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776) | filipe |
| <i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) | assanhadinho |
| <i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863 | assadinho-de-cauda-preta |
| <i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847) | papa-moscas-uirapurú |
| <i>Neopipo cinnamomea</i> (Lawrence, 1869) | enferrujadinho |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788) | gibão-de-couro |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868) | enferrujado |
| <i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831) | guaracavuçu |
| <i>Empidonax traillii</i> (Audubon, 1828) | maria-fibiu |
| <i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895 | papa-moscas-de-alder |
| <i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831) | piui-boreal |
| <i>Contopus fumigatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | piui-de-topete |
| <i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766) | piui-verdadeiro |
| <i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825) | papa-moscas-cinzento |
| <i>Contopus albogularis</i> (Berlioz, 1962) | piui-queixado |
| <i>Contopus nigrescens</i> (Sclater & Salvin, 1880) | piui-preto |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783) | príncipe |
| <i>Lessonia rufa</i> (Gmelin, 1789) | colegial |
| <i>Knipolegus striaticeps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | maria-preta-acinzentada |
| <i>Knipolegus hudsoni</i> Sclater, 1872 | maria-preta-do-sul |
| <i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868) | pretinho-do-igapó |
| <i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818) | maria-preta-de-bico-azulado |
| <i>Knipolegus poecilurus</i> (Sclater, 1862) | maria-preta-de-cauda-ruiva |
| <i>Knipolegus orenocensis</i> Berlepsch, 1864 | maria-preta-ribeirinha |
| <i>Knipolegus aterrimus</i> Kaup, 1853 | maria-preta-bate-rabo |
| <i>Knipolegus franciscanus</i> Sneath, 1928 | maria-preta-do-nordeste |
| <i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828 | maria-preta-de-penacho |
| <i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818) | maria-preta-de-garganta-vermelha |
| <i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789) | viuvinha-deóculos |
| <i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868) | maria-da-praia |
| <i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818) | suiriri-pequeno |
| <i>Muscisaxicola fluviatilis</i> Sclater & Salvin, 1866 | gaúcha-d'água |
| <i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816) | primavera |
| <i>Xolmis coronatus</i> (Vieillot, 1823) | noivinha-coroada |
| <i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823) | noivinha-branca |
| <i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823) | noivinha |
| <i>Xolmis dominicanus</i> (Vieillot, 1823) | noivinha-de-rabo-preto |
| <i>Neoxolmis rufiventris</i> (Vieillot, 1823) | gaúcho-chocolate |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-------------------------------------|
| <i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818) | tesoura-do-brejo |
| <i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823) | tesoura-cinzenta |
| <i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783) | lavadeira-do-norte |
| <i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825) | lavadeira-de-cara-branca |
| <i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766) | lavadeira-mascarada |
| <i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764) | freirinha |
| <i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816) | galito |
| <i>Alectrurus risora</i> (Vieillot, 1824) | tesoura-do-campo |
| <i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818) | viuvinha |
| <i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819) | suiriri-cavaleiro |
| TYRANNINAE Vigors, 1825 | |
| <i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818) | bem-te-vi-pirata |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766) | bentevizinho-de-asa-ferrugínea |
| <i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825) | bentevizinho-de-penacho-vermelho |
| <i>Myiozetetes granadensis</i> Lawrence, 1862 | bem-te-vi-de-cabeça-cinza |
| <i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858) | bem-te-vi-barulhento |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766) | bem-te-vi |
| <i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823) | bentevizinho-do-brejo |
| <i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831) | bem-te-vi-pequeno |
| <i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868) | bem-te-vi-da-copa |
| <i>Myiodynastes luteiventris</i> Sclater, 1859 | bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776) | bem-te-vi-rajado |
| <i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766) | neinei |
| <i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825) | suiriri-de-garganta-rajada |
| <i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818) | peitica |
| <i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | peitica-de-chapéu-preto |
| <i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856 | suiriri-de-garganta-branca |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819 | suiriri |
| <i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808 | tesourinha |
| <i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1766) | suiriri-valente |
| [<i>Tyrannus dominicensis</i> (Gmelin, 1788)] | |
| <i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) | vissíá |
| <i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873) | vissíá-cantor |
| <i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) | gritador |
| <i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816) | caneleiro |
| <i>Casiornis fuscus</i> Sclater & Salvin, 1873 | caneleiro-enxofre |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | maria-cavaleira-pequena |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859 | irré |
| <i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789) | maria-cavaleira |
| <i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776) | maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado |
| <i>Ramphotricon megacephalum</i> (Swainson, 1835) | maria-cabeçuda |
| <i>Ramphotricon ruficauda</i> (Spix, 1825) | bico-chato-de-rabo-vermelho |
| <i>Ramphotricon fuscicauda</i> Chapman, 1925 | maria-de-cauca-escura |
| <i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868 | capitão-castanho |
| <i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789) | tinguaçu-ferrugem |
| <i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859 | tinguaçu-de-barriga-amarela |
| <i>Attila bolivianus</i> Lafresnaye, 1848 | bzte-pára |
| <i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819) | capitão-de-saíra |
| <i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) | capitão-de-saíra-amarelo |
| OXYRUNCIDAE Ridgway, 1906 | |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821 | araponga-do-horto |
| COTINGIDAE Bonaparte, 1849 | |
| PHYTOTOMINAE Swainson, 1837 | |
| <i>Phytotoma rutila</i> Vieillot, 1818 | corta-ramos |
| RUPICOLINAE Bonaparte, 1853 | |
| <i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766) | galo-da-serra |
| <i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758) | saurá |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|-------------------------------|
| <i>Phoenicircus nigricollis</i> Swainson, 1832 | saurá-de-pescoço-preto |
| COTINGINAE Bonaparte, 1849 | |
| <i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816 | tesourinha-da-mata |
| <i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821) | corocochó |
| <i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820) | sabiá-pimenta |
| [<i>Pipreola whitelyi</i> Salvin & Godman, 1884] | |
| <i>Cotinga maynana</i> (Linnaeus, 1766) | cotinga-azul |
| <i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766) | anambé-de-peito-roxo |
| <i>Cotinga maculata</i> (Statius Muller, 1776) | crejoá |
| <i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766) | anambé-azul |
| <i>Procnias albus</i> (Hermann, 1783) | araponga-da-amazônia |
| <i>Procnias averano</i> (Hermann, 1783) | araponga-do-nordeste |
| <i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817) | araponga |
| <i>Tijuca atra</i> Ferrusac, 1829 | saudade |
| <i>Tijuca condita</i> Snow, 1980 | saudade-de-asa-cinza |
| <i>Calyptura cristata</i> (Vieillot, 1818) | tietê-de-coroa |
| <i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) | cricrió |
| <i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844) | tropeiro-da-serra |
| <i>Lipaugus streptophorus</i> (Salvin & Godman, 1884) | cricrió-de-cinta-vermelha |
| <i>Conioptilon mcilhennyi</i> Lowery & O'Neill, 1966 | anambé-de-cara-preta |
| <i>Porphyrolaema porphyrolaema</i> (Deville & Sclater, 1852) | cotinga-de-garganta-encarnada |
| <i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764) | anambé-pompadora |
| <i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839) | anambé-de-rabo-branco |
| <i>Xipholena atropurpurea</i> (Wied, 1820) | anambé-de-asa-branca |
| <i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758) | anambé-pombo |
| <i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776) | anambé-uma |
| <i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792) | anambé-militar |
| <i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792) | pavó |
| <i>Perissocephalus tricolor</i> (Statius Muller, 1776) | maú |
| <i>Cephalopterus ornatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 | anambé-preto |
| PIPRIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853) | fruxu-do-cerradão |
| <i>Neopelma chrysocephalum</i> (Pelzeln, 1868) | fruxu-do-carrasco |
| <i>Neopelma aurifrons</i> (Wied, 1831) | fruxu-baiano |
| <i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944 | fruxu |
| <i>Neopelma sulphureiventer</i> (Hellmayr, 1903) | fruxu-de-barriga-amarela |
| <i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906) | uirapuruzinho |
| <i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) | uirapuruzinho-do-norte |
| <i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) | papinho-amarelo |
| <i>Piprites pileata</i> (Temminck, 1822) | caneleirinho-de-chapéu-preto |
| <i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809) | tangarazinho |
| <i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) | dançarino-de-garganta-branca |
| <i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819) | tangará-rajado |
| <i>Machaeropterus striolatus</i> (Bonaparte, 1838) | tangará-riscado |
| <i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852) | uirapuru-cigarra |
| <i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825) | uirapuru-de-chapéu-azul |
| <i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865) | uirapuru-de-chapéu-branco |
| <i>Lepidothrix vilasboasi</i> (Sick, 1959) | dançador-de-coroa-dourada |
| <i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851) | cabeça-de-prata |
| <i>Lepidothrix serena</i> (Linnaeus, 1766) | uirapuru-estrela |
| <i>Lepidothrix suavissima</i> (Salvin & Godman, 1882) | dançador-do-tepui |
| <i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766) | rendeira |
| <i>Antilophia bokermanni</i> Coelho & Silva, 1998 | soldadinho-do-araripe |
| <i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823) | soldadinho |
| <i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766) | tangará-falso |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793) | tangará |
| <i>Xenopipo uniformis</i> (Salvin & Godman, 1884) | dançarino-oliváceo |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|---|
| <i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847 [<i>Heterocercus aurantiivertex</i> Sclater & Salvin, 1880] <i>Heterocercus flavivertex</i> Pelzeln, 1868 <i>Heterocercus linteatus</i> (Strickland, 1850) <i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pipra filicauda</i> Spix, 1825 <i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906 <i>Pipra cornuta</i> Spix, 1825 <i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821 <i>Pipra chloromeros</i> Tschudi, 1844 | pretinho dançarino-de-crista-amarela coroa-de-fogo cabeça-branca uirapuru-vermelho rabo-de-aramé uirapuru-laranja dançador-de-crista cabeça-de-ouro cabeça-encarnada dançador-de-cauda-graduada |
| TITYRIDAE Gray, 1840 | |
| <i>Schiffornis major</i> Des Murs, 1856 <i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831) <i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838) <i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817) <i>Laniisoma elegans</i> (Thunberg, 1823) <i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847 <i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817) <i>Iodopleura pipra</i> (Lesson, 1831) <i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823) <i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825) <i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816) <i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783) <i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827) <i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818) <i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823) <i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830) <i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823) <i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869) | flautim-ruivo flautim-marrom flautim chorona-cinza chibante anambé-de-coroa anambé-fusco anambezinho anambé-branco-de-bochecha-parda anambé-branco-de-rabo-preto anambé-branco-de-máscara-negra caneleiro-verde caneleiro-cinzento caneleiro caneleiro-preto caneleiro-bordado caneleiro-da-guiana caneleiro-pequeno caneleiro-de-chapéu-preto tijeira |
| PASSERI Linné, 1758 | |
| CORVIDA Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988 | |
| VIREONIDAE Swainson, 1837 | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789) <i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Vireo gracilirostris</i> Sharpe, 1890 <i>Vireo flavoviridis</i> (Cassin, 1851) <i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808) <i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822 <i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835) <i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822 <i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867 <i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866 <i>Hylophilus sclateri</i> Salvin & Godman, 1883 <i>Hylophilus brunneiceps</i> Sclater, 1866 <i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868 <i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859 | pitiguari assobiador-do-castanhal juruviara juruviara-de-noronha juruviara-verde-amarelada juruviara-barbuda verdinho-coroado vite-vite-de-olho-cinza vite-vite verdinho-da-várzea vite-vite-de-cabeça-cinza vite-vite-do-tepui vite-vite-de-cabeça-marrom vite-vite-de-barriga-marela vite-vite-camurça vite-vite-uirapuru |
| CORVIDAE Leach, 1820 | |
| <i>Cyanocorax violaceus</i> Du Bus, 1847 <i>Cyanocorax cyanomelas</i> (Vieillot, 1818) <i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818) <i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823) | gralha-violácea gralha-do-pantanal gralha-azul gralha-do-campo |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|--------------------------------|
| <i>Cyanocorax cayanus</i> (Linnaeus, 1766) | gralha-da-guiana |
| <i>Cyanocorax heilprini</i> Gentry, 1885 | gralha-de-nuca-azul |
| <i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818) | gralha-piçaça |
| <i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821) | gralha-cancã |
| PASSERIDA Linné, 1758 | |
| HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783) | andorinha-do-rio |
| <i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-de-sobre-branco |
| <i>Tachycineta meyeni</i> (Cabanis, 1850) | andorinha-chilena |
| <i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-do-campo |
| <i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758) | andorinha-azul |
| <i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789) | andorinha-doméstica-grande |
| <i>Progne elegans</i> Baird, 1865 | andorinha-do-sul |
| <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-pequena-de-casa |
| <i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789) | peitoril |
| <i>Atticora melanoleuca</i> (Wied, 1820) | andorinha-de-coleira |
| <i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853) | calcinha-branca |
| <i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822) | andorinha-morena |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-serradora |
| <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | andorinha-do-barranco |
| <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | andorinha-de-bando |
| <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-de-dorso-acanelado |
| TROGLODYTIDAE Swainson, 1831 | |
| <i>Campylorhynchus griseus</i> (Swainson, 1838) | garrincha-dos-lhanos |
| <i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831) | catatau |
| <i>Odontorchilus cinereus</i> (Pelzeln, 1868) | cambaxirra-cinzenta |
| <i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790) | corruíra-do-campo |
| <i>Thryothorus genibarbis</i> Swainson, 1838 | garrinchão-pai-avô |
| <i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) | garrinchão-coraia |
| <i>Thryothorus leucotis</i> Lafresnaye, 1845 | garrinchão-de-barriga-vermelha |
| <i>Thryothorus guarayanus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | garrincha-do-oeste |
| <i>Thryothorus longirostris</i> Vieillot, 1819 | garrinchão-de-bico-grande |
| <i>Thryothorus griseus</i> (Todd, 1925) | garrincha-cinza |
| <i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823 | corruíra |
| <i>Troglodytes rufulus</i> Cabanis, 1849 | corruíra-do-tepui |
| <i>Henicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847) | uirapuru-de-peito-branco |
| <i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855) | uirapuru-veado |
| <i>Microcerculus ustulatus</i> Salvin & Godman, 1883 | flautista-do-tepui |
| <i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783) | uirapuru-de-asa-branca |
| <i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783) | uirapuru-verdadeiro |
| <i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766) | japacanim |
| POLIOPTILIDAE Baird, 1858 | |
| <i>Microbates collaris</i> (Pelzeln, 1868) | bico-assovelado-de-coleira |
| <i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819 | bico-assovelado |
| <i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788) | balança-rabo-de-chapéu-preto |
| <i>Polioptila lactea</i> Sharpe, 1885 | balança-rabo-leitoso |
| <i>Polioptila guianensis</i> Todd, 1920 | balança-rabo-da-copa |
| <i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817) | balança-rabo-de-máscara |
| TURDIDAE Rafinesque, 1815 | |
| <i>Cichlopsis leucogenys</i> Cabanis, 1851 | sabiá-castanho |
| <i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817) | sabiá-norte-americano |
| <i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848) | sabiá-de-cara-cinza |
| <i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840) | sabiá-de-óculos |
| <i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818) | sabiá-una |
| <i>Platycichla leucops</i> (Taczanowski, 1877) | sabiá-preto |
| <i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887) | sabiá-ferreiro |
| <i>Turdus olivater</i> (Lafresnaye, 1848) | sabiá-de-cabeça-preta |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|---------------------------------|
| <i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818 | sabiá-laranjeira |
| <i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818 | sabiá-barranco |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850 | sabiá-poca |
| <i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858 | caraxué-de-bico-preto |
| <i>Turdus lawrencii</i> Coues, 1880 | caraxué-de-bico-amarelo |
| <i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823 | sabiá-da-mata |
| <i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869 | sabiá-bicolor |
| <i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848 | caraxué |
| <i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 | sabiá-coleira |
| MIMIDAE Bonaparte, 1853 | |
| <i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807) | sabiá-da-praia |
| <i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823) | sabiá-do-campo |
| <i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818) | calhandra-de-três-rabos |
| MOTACILLIDAE Horsfield, 1821 | |
| <i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855 | caminheiro-zumbidor |
| <i>Anthus furcatus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | caminheiro-de-unha-curta |
| <i>Anthus correndera</i> Vieillot, 1818 | caminheiro-de-espora |
| <i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878 | caminheiro-grande |
| <i>Anthus hellmayri</i> Hartert, 1909 | caminheiro-de-barriga-acanelada |
| COEREBIDAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 | |
| <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) | cambacica |
| THRAUPIDAE Cabanis, 1847 | |
| <i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839) | sanhaçu-pardo |
| <i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790) | sanhaçu-de-coleira |
| <i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817) | bico-de-veludo |
| <i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788) | tietinga |
| <i>Conothraupis speculigera</i> (Gould, 1855) | tiê-preto-e-branco |
| <i>Conothraupis mesoleuca</i> (Berlioz, 1939) | tiê-bicudo |
| <i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) | pipira-de-bico-vermelho |
| <i>Compsothraupis loricata</i> (Lichtenstein, 1819) | carretão |
| <i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783) | saíra-de-chapéu-preto |
| <i>Nemosia rourei</i> Cabanis, 1870 | saíra-apunhalada |
| <i>Mitrospingus oleagineus</i> (Salvin, 1886) | pipira-olivácea |
| <i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819) | catirumbava |
| <i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | saí-canário |
| <i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844) | cabecinha-castanha |
| <i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831) | bandoleta |
| <i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818) | tiê-de-topete |
| <i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822) | tiê-do-mato-grosso |
| <i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758) | sanhaçu-de-fogo |
| <i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, 1789) | sanhaçu-vermelho |
| <i>Piranga leucoptera</i> Trudeau, 1839 | sanhaçu-escarlate |
| <i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817) | sanhaçu-de-asa-branca |
| <i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825) | pipira-da-taoca |
| <i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) | tiê-galo |
| <i>Tachyphonus nattereri</i> Pelzeln, 1870 | pipira-de-natterer |
| <i>Tachyphonus rufiventer</i> (Spix, 1825) | tem-tem-de-crista-amarela |
| <i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) | tem-tem-de-topete-ferrugíneo |
| <i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | tem-tem-de-dragona-branca |
| <i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822) | tiê-preto |
| <i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783) | pipira-preta |
| <i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838 | tem-tem-de-dragona-vermelha |
| <i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783) | pipira-parda |
| <i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | pipira-de-asa-branca |
| <i>Ramphocelus nigrogularis</i> (Spix, 1825) | pipira-de-máscara |
| <i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764) | pipira-de-máscara |
| <i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766) | tiê-sangue |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|-----------------------------|
| <i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766) | sanhaçu-da-amazônia |
| <i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766) | sanhaçu-cinzentos |
| <i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817) | sanhaçu-de-encontro-azul |
| <i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789) | sanhaçu-de-encontro-amarelo |
| <i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823) | sanhaçu-do-coqueiro |
| <i>Thraupis bonariensis</i> (Gmelin, 1789) | sanhaçu-papa-laranja |
| <i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819) | pipira-azul |
| <i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823) | sanhaçu-frade |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819) | saíra-viúva |
| <i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823) | cigarra-do-campo |
| <i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) | saíra-de-bando |
| <i>Tangara brasiliensis</i> (Linnaeus, 1766) | cambada-de-chaves |
| <i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832) | sete-cores-da-amazônia |
| <i>Tangara fastuosa</i> (Lesson, 1831) | pintor-verdadeiro |
| <i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776) | saíra-sete-cores |
| <i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776) | saíra-militar |
| <i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819) | saíra-lagarta |
| <i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819) | saíra-douradinha |
| <i>Tangara schrankii</i> (Spix, 1825) | saíra-ouro |
| <i>Tangara xanthogastra</i> (Sclater, 1851) | saíra-de-barriga-amarela |
| <i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) | saíra-negaça |
| <i>Tangara guttata</i> (Cabanis, 1850) | saíra-pintada |
| <i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776) | saíra-carijó |
| <i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758) | saíra-de-cabeça-castanha |
| <i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766) | saíra-amarela |
| <i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806) | saíra-sapucaia |
| <i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850) | saíra-preciosa |
| <i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | saíra-de-cabeça-azul |
| <i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838) | saíra-mascarada |
| <i>Tangara cyanoptera</i> (Swainson, 1834) | saíra-de-cabeça-preta |
| <i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) | saíra-diamante |
| <i>Tangara callophrys</i> (Cabanis, 1849) | saíra-opala |
| <i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811) | saí-andorinha |
| <i>Dacnis albiventris</i> (Sclater, 1852) | saí-de-barriga-branca |
| <i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) | saí-de-máscara-preta |
| <i>Dacnis flaviventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | saí-amarela |
| <i>Dacnis nigripes</i> Pelzeln, 1856 | saí-de- pernas-pretas |
| <i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) | saí-azul |
| <i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847) | saí-de-bico-curto |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | saí-de-perna-amarela |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | saíra-beija-flor |
| <i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758) | saí-verde |
| <i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766) | saíra-de-papo-preto |
| <i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818) | saíra-ferrugem |
| <i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818) | saíra-galega |
| <i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824) | figuinha-de-rabo-castanho |
| <i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809) | figuinha-do-mangue |
| <i>Conirostrum margaritae</i> (Holt, 1931) | figuinha-amazônica |
| <i>Diglossa duidae</i> Chapman, 1929 | fura-flor-escamado |
| <i>Diglossa major</i> Cabanis, 1849 | fura-flor-escamado |
| EMBERIZIDAE Vigors, 1825 | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776) | tico-tico |
| <i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792) | tico-tico-do-campo |
| <i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825) | cigarrinha-do-campo |
| <i>Porphyrospiza caerulescens</i> (Wied, 1830) | campainha-azul |
| <i>Phrygilus fruticeti</i> (Kittlitz, 1833) | canário-andino-negro |
| <i>Diuca diuca</i> (Molina, 1782) | diuca |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|--|--------------------------------|
| <i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851 | cigarra-bambu |
| <i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817) | tico-tico-do-banhado |
| <i>Poospiza thoracica</i> (Nordmann, 1835) | peito-pinhão |
| <i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | quem-te-vestiu |
| <i>Poospiza lateralis</i> (Nordmann, 1835) | quete |
| <i>Poospiza melanoleuca</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | capacetinho |
| <i>Poospiza cinerea</i> Bonaparte, 1850 | capacetinho-do-oco-do-pau |
| <i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870 | canário-rasteiro |
| <i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851 | canário-do-amazonas |
| <i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766) | canário-da-terra-verdadeiro |
| <i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789) | tipio |
| <i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817) | canário-do-campo |
| <i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907 | canário-do-brejo |
| <i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789) | sabiá-do-banhado |
| <i>Embernagra longicauda</i> Strickland, 1844 | rabo-mole-da-serra |
| <i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766) | tiziu |
| <i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869) | pixoxó |
| <i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820) | cigarra-verdadeira |
| <i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862) | cigarrinha-do-norte |
| <i>Sporophila intermedia</i> Cabanis, 1851 | papa-capim-cinza |
| <i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830) | patativa |
| <i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789) | coleiro-do-norte |
| <i>Sporophila murallae</i> Chapman, 1915 | papa-capim-de-caquetá |
| <i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783) | coleiro-do-brejo |
| <i>Sporophila bouvronides</i> (Lesson, 1831) | estrela-do-norte |
| <i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758) | bigodinho |
| <i>Sporophila luctuosa</i> (Lafresnaye, 1843) | papa-capim-preto-e-branco |
| <i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823) | baiano |
| <i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894) | papa-capim-de-costas-cinzas |
| <i>Sporophila melanops</i> (Pelzeln, 1870) | papa-capim-do-bananal |
| <i>Sporophila caeruleascens</i> (Vieillot, 1823) | coleirinho |
| <i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825) | golinho |
| <i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817) | chorão |
| <i>Sporophila nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | caboclinho-do-sertão |
| <i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776) | caboclinho |
| <i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758) | caboclinho-lindo |
| <i>Sporophila hypoxantha</i> Cabanis, 1851 | caboclinho-de-barriga-vermelha |
| <i>Sporophila ruficollis</i> Cabanis, 1851 | caboclinho-de-papo-escuro |
| <i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883) | caboclinho-de-papo-branco |
| <i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849 | caboclinho-de-peito-castanho |
| <i>Sporophila hypochroma</i> Todd, 1915 | caboclinho-de-sobre-ferrugem |
| <i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839) | caboclinho-de-chapéu-cinzento |
| [<i>Sporophila zelichi</i> Naroski, 1977] | |
| <i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870) | caboclinho-de-barriga-preta |
| <i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766) | curió |
| <i>Sporophila crassirostris</i> (Gmelin, 1789) | bicudinho |
| <i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851) | bicudo |
| <i>Amaurospiza moesta</i> (Hartlaub, 1853) | negrinho-do-mato |
| <i>Dolospingus fringilloides</i> (Pelzeln, 1870) | papa-capim-de-coleira |
| <i>Catamenia homochroa</i> Sclater, 1859 | patativa-da-amazônia |
| <i>Tiaris obscurus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | cigarra-parda |
| <i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830) | cigarra-do-coqueiro |
| <i>Arremonops conirostris</i> (Bonaparte, 1850) | tico-tico-cantor |
| <i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783) | tico-tico-de-bico-preto |
| <i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838 | tico-tico-do-mato |
| <i>Arremon franciscanus</i> Raposo, 1997 | tico-tico-do-são-francisco |
| <i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838 | tico-tico-de-bico-amarelo |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|--------------------------------|
| <i>Atlapetes personatus</i> (Cabanis, 1848) | tico-tico-do-tepui |
| <i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905 | mineirinho |
| <i>Coryphasiza melanotis</i> (Temminck, 1822) | tico-tico-de-máscara-negra |
| <i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821) | tico-tico-rei-cinza |
| <i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776) | tico-tico-rei |
| <i>Gubernatrix cristata</i> (Vieillot, 1817) | cardeal-amarelo |
| <i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776) | cardeal |
| <i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758) | cardeal-do-nordeste |
| <i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766) | cardeal-da-amazônia |
| <i>Paroaria baeri</i> Hellmayr, 1907 | cardeal-de-goiás |
| <i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | cavalaria |
| CARDINALIDAE Ridgway, 1901 | |
| <i>Pheucticus aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | rei-do-bosque |
| <i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) | furriel |
| <i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867) | furriel-de-encontro |
| <i>Periporphyrus erythromelas</i> (Gmelin, 1789) | bicudo-encarnado |
| <i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766) | bico-encarnado |
| <i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800) | pimentão |
| <i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776) | tempera-viola |
| <i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817 | sabiá-congá |
| <i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | trinca-ferro-verdadeiro |
| <i>Saltator maxillosus</i> Cabanis, 1851 | bico-grosso |
| <i>Saltator aurantirostris</i> Vieillot, 1817 | bico-duro |
| <i>Saltator atricollis</i> Vieillot, 1817 | bico-de-pimenta |
| <i>Cyanoloxia glaucoaeerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | azulinho |
| <i>Cyanocompsa cyanoidea</i> (Lafresnaye, 1847) | azulão-da-amazônia |
| <i>Cyanocompsa brissonii</i> (Lichtenstein, 1823) | azulão |
| <i>Spiza americana</i> (Gmelin, 1789) | papa-capim-americano |
| PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 | |
| <i>Parula pitaiyumi</i> (Vieillot, 1817) | mariquita |
| <i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766) | mariquita-amarela |
| <i>Dendroica striata</i> (Forster, 1772) | mariquita-de-perna-clara |
| <i>Dendroica fusca</i> (Statius Muller, 1776) | mariquita-papo-de-fogo |
| [<i>Dendroica cerulea</i> (Wilson, 1810)] | |
| [<i>Dendroica virens</i> (Gmelin, 1789)] | |
| <i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758) | mariquita-de-rabo-vermelho |
| [<i>Protonotaria citrea</i> (Boddaert, 1783)] | |
| <i>Seiurus noveboracensis</i> (Gmelin, 1789) | mariquita-boreal |
| <i>Oporornis agilis</i> (Wilson, 1812) | mariquita-de-connecticut |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789) | pia-cobra |
| <i>Myioborus miniatus</i> (Swainson, 1827) | mariquita-cinza |
| <i>Myioborus castaneocapillus</i> (Cabanis, 1849) | mariquita-de-cabeça-parda |
| <i>Basileuterus bivittatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | pula-pula-de-duas-fitas |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830) | pula-pula |
| <i>Basileuterus hypoleucus</i> Bonaparte, 1830 | pula-pula-de-barriga-branca |
| <i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865) | canário-do-mato |
| <i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817) | pula-pula-assobiador |
| <i>Basileuterus leucophrys</i> Pelzeln, 1868 | pula-pula-de-sobrancelha |
| <i>Phaeothlypis fulvicauda</i> (Spix, 1825) | pula-pula-de-cauda-avermelhada |
| <i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821) | pula-pula-ribeirinho |
| <i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865 | polícia-do-mato |
| ICTERIDAE Vigors, 1825 | |
| <i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, 1824) | japu-pardo |
| <i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776) | japu-verde |
| <i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769) | japu |
| <i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824) | japuaçu |

| Nome do Táxon | Nome em Português |
|---|----------------------------|
| <i>Clypicterus oseryi</i> (Deville, 1849) | japu-de-capacete |
| <i>Ocyalus latirostris</i> (Swainson, 1838) | japu-de-rabo-verde |
| <i>Cacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816) | iraúna-de-bico-branco |
| <i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758) | xexéu |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) | guaxe |
| <i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825) | tecelão |
| <i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766) | encontro |
| <i>Icterus chryscephalus</i> (Linnaeus, 1766) | rouxinol-do-rio-negro |
| [<i>Icterus galbula</i> (Linnaeus, 1758)] | |
| <i>Icterus nigrogularis</i> (Hahn, 1819) | joão-pinto-amarelo |
| <i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788) | corrupião |
| <i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829) | joão-pinto |
| <i>Macroagelaius imthurni</i> (Sclater, 1881) | iraúna-da-guiana |
| <i>Gymnomystax mexicanus</i> (Linnaeus, 1766) | iratauá-grande |
| <i>Lamprosar tanagrinus</i> (Spix, 1824) | iraúna-velada |
| <i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819) | graúna |
| <i>Curaeus forbesi</i> (Sclater, 1886) | anumará |
| <i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786) | cardeal-do-banhado |
| <i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819) | carretão |
| <i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782) | sargento |
| <i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819) | garibaldi |
| <i>Chrysomus icterocephalus</i> (Linnaeus, 1766) | iratauá-pequeno |
| <i>Xanthopsar flavus</i> (Gmelin, 1788) | veste-amarela |
| <i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819) | chopim-do-brejo |
| <i>Pseudoleistes virescens</i> (Vieillot, 1819) | dragão |
| <i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819) | asa-de-telha |
| <i>Agelaioides fringillarius</i> (Spix, 1824) | asa-de-telha-pálido |
| <i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866 | vira-bosta-picumã |
| <i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788) | iraúna-grande |
| <i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789) | vira-bosta |
| <i>Quiscalus lugubris</i> Swainson, 1838 | iraúna-do-norte |
| <i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758) | polícia-inglesa-do-norte |
| <i>Sturnella supercilialis</i> (Bonaparte, 1850) | polícia-inglesa-do-sul |
| <i>Sturnella defilippii</i> (Bonaparte, 1850) | peito-vermelho-grande |
| <i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758) | pedro-ceroulo |
| <i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758) | triste-pia |
| FRINGILLIDAE Leach, 1820 | |
| [<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)] | |
| <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | pintassilgo-europeu |
| <i>Carduelis yarrellii</i> Audubon, 1839 | pintassilgo-do-nordeste |
| <i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805) | pintassilgo |
| <i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855 | gaturamo-anão |
| <i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766) | fim-fim |
| <i>Euphonia finschi</i> Sclater & Salvin, 1877 | gaturamo-capim |
| <i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758) | gaturamo-verdadeiro |
| <i>Euphonia laniirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | gaturamo-de-bico-grosso |
| <i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825) | cais-cais |
| <i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818) | gaturamo-rei |
| <i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869 | gaturamo-verde |
| <i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849 | gaturamo-de-barriga-branca |
| <i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834 | fim-fim-grande |
| <i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819) | gaturamo-do-norte |
| <i>Euphonia cayennensis</i> (Gmelin, 1789) | gaturamo-preto |
| <i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801) | ferro-velho |
| <i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822) | bandeirinha |
| ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850 | |
| <i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758) | bico-de-lacre |

| Nome do Taxon | Nome em Português |
|--|-------------------|
| PASSERIDAE Rafinesque, 1815 <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | pardal |

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO

Presidente Emérito:

Fernando da Costa Novaes (1927-2004)

Membros honorários:

Edwin O'Neill Willis
Hélio Ferraz de Almeida Camargo
José Hidasi
Rolf Grantsau
Walter Adolfo Voss
William Belton

Núcleo Administrativo:

José Fernando Pacheco - coordenador
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo - sub-coordenador
Dimas Pioli - secretário

Núcleo de Redatores:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Alberto Urben Filho | Glaysen Ariel Bencke |
| Alexandre Aleixo | Gustavo Sigrist Betini |
| Ana Beatriz Aroeira Soares | Iury Accordi |
| Fábio Olmos | Sônia Aline Roda |
| Francisco Mallet-Rodrigues | Vítor de Queiroz Piacentini |
| Giovanni Nightingal Mauricio | |

Conselho Consultivo:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Bret M. Whitney | Luís Fábio Silveira |
| Fernando Costa Straube | Marcos Ricardo Bornschein |
| Herculano Alvarenga | Mario Cohn-Haft |
| João Luiz Xavier do Nascimento | Ricardo Parrini |
| Juan Mazar Barnett | Rudi Ricardo Laps |
| Jules R. Soto | |