

Primeiro registro de *Nannopsittaca dachilleae* no Brasil

Bret M. Whitney¹, David C. Oren²

¹ Museum of Natural Science, 119 Foster Hall, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 70803, USA.

² Museu Paraense Emílio Goeldi, Departamento de Zoologia, C. P. 399 66017-970 Belém, Pará, Brasil.

Recebido em 28 de setembro de 2000.

ABSTRACT. First record of Amazonian Parrotlet (*Nannopsittaca dachilleae*) in Brazil.

We report the first record for Amazonian Parrotlet for Brazil: five specimens, housed at the Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará, collected on 19 July 1996 on the upper Rio Moa in Parque Nacional da Serra do Divisor, Acre. The species should be sought in seasonally flooded forest all along the Brazilian borders with Peru and Bolivia, and especially in the region of the upper Rios Juruá and Purús.

Keywords: Acre, birds, Brazil, distribution, *Nannopsittaca dachilleae*, Psittacidae, várzea.

Palavras-Chave: aves, Acre, Brasil, distribuição, *Nannopsittaca dachilleae*, Psittacidae, várzea.

Durante a primeira de duas fases de uma Avaliação Ecológica Rápida (AER) do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) no noroeste do estado do Acre, Brasil, BW coletou cinco exemplares do pequeno psitacídeo *Nannopsittaca dachilleae*. Os periquitos estavam forrageando, junto com vários outros conspecíficos, nas flores na copa de uma árvore (*Inga* sp.), em mata de várzea, poucos metros afastada da margem direita do alto rio Moa (Município de Mâncio Lima; 07°27'S, 73°38'W) na manhã do dia 19 de julho de 1996. Estes exemplares, dois machos e três fêmeas, preparados por Dionísio C. Pimentel Neto, estão depositados no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Belém, Pará, com os seguintes números do acervo: 52709(m), 52710(f), 52711(f), 52712(f), 52713(m). Amostras de DNA foram retiradas de todos os cinco, e atualmente estão guardadas no MPEG. Gravações foram arquivadas no Arquivo Sonoro Elias P. Coelho (ASEC) do Departamento de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Nannopsittaca dachilleae foi descrita recentemente (O'Neill *et al.* 1991), e é conhecida de várias localidades nas matas de baixada (principalmente de várzea) do sudeste de Peru e noroeste de Bolívia; sua ocorrência em território brasileiro sempre foi considerada promissora. Nossa pequena série serve para documentar *N. dachilleae* como membro da avifauna brasileira, e estender sua distribuição aproximadamente 100 km ao norte. Sendo uma espécie relativamente inconspícua, e fácil de não ser detectada, devido a sua semelhança geral (em comportamento, maneira de vôo, e voz) aos periquitos do gênero *Forpus*, sugerimos que *Nannopsittaca dachilleae* pode ter uma distribuição consideravelmente mais ampla que os poucos registros atuais indicariam, e a espécie deve ser procurada ao longo do limite brasileiro com Peru e Bolívia, e especialmente nas bacias do alto Juruá e Purús.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio de USAID, *The Nature Conservancy* (Washington, D.C., e Brasília), S.O.S. Amazônia (Rio Branco), e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) na realização do AER como parte integral do plano de manejo do PNSD.

Referência

O'Neill, J. P., C. A. Munn & I. Franke J. (1991) *Nannopsittaca dachilleae*, a new species of parrotlet from eastern Peru. *Auk* 108(2):225-229.