

Lista das Aves do Brasil
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO)
Versão 24/2/2005

www.ib.usp.br/cbro

Uma nova listagem das aves ocorrentes em território brasileiro é aqui apresentada. Além da incorporação dos novos táxons e novas ocorrências, diversas alterações na sequência, no arranjo e na grafia dos táxons foram implementadas.

A estrutura da lista, sobretudo a sequência, foi baseada grandemente na lista de aves do SACC – *South American Classification Committee* da AOU – *American Ornithologists' Union* (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html), mas há discordâncias diversas. Estas foram efetivadas, geralmente, a partir dos resultados constantes em certos trabalhos publicados, quando estes foram considerados procedentes pelo CBRO.

O CBRO, um “fórum destinado à discussão da classificação, nomenclatura e distribuição das aves brasileiras”, foi criado em abril de 1999 e oficializado como Grupo de Estudos da SBO – Sociedade Brasileira de Ornitologia em 2004.

Foi dada especial atenção à autoria e datação dos táxons, incluindo aquelas dos nomes dos táxons superiores. Os nomes em Português, um único para cada espécie, têm caráter meramente instrumental e não devem ser entendidos como uma tentativa de normatização. Para uma listagem abrangente dos nomes populares recomenda-se consultar o saite do Centro de Estudos Ornitológicos (www.ib.usp.br/ceo/nomespop.htm).

Além da lista primária (a lista principal) de aves brasileiras, há duas outras listas: secundária e terciária, que serão igualmente organizadas e permanentemente atualizadas pelo CBRO. Uma definição técnica de cada uma destas é dada a seguir.

Lista Primária - Espécies com pelo menos um dos registros de ocorrência no Brasil provido de evidência documental. Neste contexto, são evidências documentais os itens disponíveis, para consulta independente, na forma exclusiva de espécime integral ou parcial, fotografia, gravação de áudio ou vídeo, que permitam a determinação segura do táxon.

Lista Secundária - Espécies com provável ocorrência no Brasil, providas de registros específicos publicados para o país, mas cuja evidência documental não é conhecida ou disponível. Neste contexto, a ‘provável ocorrência’ de uma espécie no Brasil é inferida a partir do seu padrão distribucional e de dispersão estabelecido com base em evidências documentais

Lista Terciária - Espécies providas de registros específicos publicados para o país, mas com evidência documental inválida ou com improvável ocorrência no Brasil e carentes de evidência documental

Neste documento constam as espécies da lista primária acrescidas daquelas da lista secundária, as quais estão indicadas entre colchetes.

Recomenda-se a seguinte citação para as listas:

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2005) *Listas das aves do Brasil*. Versão 24/2/2005. Disponível em <<http://www.ib.usp.br/cbro>>. Acesso em: [data do acesso].

Legenda:

ORDEM (-iformes)

SUBORDEM (-i)

PARVORDEM (-ida)

SUPERFAMÍLIA (-oidea)

FAMÍLIA (-idae)

SUBFAMÍLIA (-inae)

Nome científico

Nome do Táxon	Nome em Português
STRUTHIONIFORMES Latham, 1790	
RHEIDAE Bonaparte, 1849	
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	ema
TINAMIFORMES Huxley, 1872	
TINAMIDAE Gray, 1840	
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuguaçu
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio
<i>Crypturellus duidae</i> Zimmer, 1938	inhambu-de-pé-cinza
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863)	inhambu-de-perna-vermelha
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	jaó-do-sul
<i>Crypturellus atrocapillus</i> (Tschudi, 1844)	inhambu-de-coroa-preta
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá
<i>Crypturellus brevirostris</i> (Pelzeln, 1863)	inhambu-carijó
<i>Crypturellus bartletti</i> (Sclater & Salvin, 1873)	inhambu-anhangáí
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz
<i>Nothura boraquira</i> (Spix, 1825)	codorna-do-nordeste
<i>Nothura minor</i> (Spix, 1825)	codorna-mineira
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela
<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-carapé
ANSERIFORMES Linnaeus, 1758	
ANHIMIDAE Stejneger, 1885	
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma
<i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816)	tachã
ANATIDAE Leach, 1820	
DENDROCYGNINAE Reichenbach, 1850	
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca
ANSERINAE Vigors, 1825	
<i>Cygnus melancoryphus</i> (Molina, 1782)	cisne-de-pescoço-preto
<i>Coscoroba coscoroba</i> (Molina, 1782)	capororoca
ANATINAE Leach, 1820	
<i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825)	pato-corredor
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato
<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907	pato-de-crista
<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)	marreca-de-coleira
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Anas sibilatrix</i> Poepig, 1829	marreca-oveira
<i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816	marreca-pardinha
[<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758]	
<i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789	marreca-parda
<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho
<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	marreca-cricri
<i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766	marreca-de-asa-azul
<i>Anas cyanoptera</i> Vieillot, 1816	marreca-colorada
<i>Anas platalea</i> Vieillot, 1816	marreca-colhereira
<i>Netta erythrophthalma</i> (Wied, 1832)	paturi-preta
<i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816)	marrecão
<i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817	pato-mergulhão
<i>Heteronetta atricapilla</i> (Merrem, 1841)	marreca-de-cabeça-preta
<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-de-bico-roxo
<i>Oxyura vittata</i> (Philippi, 1860)	marreca-pé-na-bunda
GALLIFORMES Linnaeus, 1758	
CRACIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Ortalis canicollis</i> (Wagler, 1830)	aracuã-do-pantanal
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã
<i>Ortalis motmot</i> (Linnaeus, 1766)	aracuã-pequeno
<i>Ortalis superciliaris</i> (Gray, 1867)	aracuã-de-sobrancelhas
<i>Penelope marail</i> (Statius Muller, 1776)	jacumirim
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825	jacu-de-spix
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu
<i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830	jacupiranga
<i>Penelope ochrogaster</i> Pelzeln, 1870	jacu-de-barriga-castanha
<i>Penelope jacucaca</i> Spix, 1825	jacucaca
<i>Pipile cumanensis</i> (Jacquin, 1784)	jacutinga-de-garganta-azul
<i>Pipile cujubi</i> (Pelzeln, 1858)	cujubi
<i>Pipile jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga
<i>Nothocrax urumutum</i> (Spix, 1825)	urumutum
<i>Mitu tomentosum</i> (Spix, 1825)	mutum-do-norte
<i>Mitu tuberosum</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo
<i>Mitu mitu</i> (Linnaeus, 1766)	mutum-do-nordeste
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	mutum-poranga
<i>Crax globulosa</i> Spix, 1825	mutum-de-fava
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	mutum-de-penacho
<i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825	mutum-de-bico-vermelho
ODONTOPHORIDAE Gould, 1844	
<i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	uru-do-campo
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru
<i>Odontophorus stellatus</i> (Gould, 1843)	uru-de-topete
PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888	
PODICIPEDIDAE Bonaparte, 1831	
<i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	mergulhão-de-orelha-branca
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador
<i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783)	mergulhão-grande
<i>Podiceps occipitalis</i> Garnot, 1826	mergulhão-de-orelha-amarela
SPHENISCIFORMES Sharpe, 1891	
SPHENISCIDAE Bonaparte, 1831	
<i>Aptenodytes patagonicus</i> Miller, 1778	pingüim-rei
<i>Eudyptes chrysocome</i> (Forster, 1781)	pingüim-de-penacho-amarelo
<i>Eudyptes chrysolophus</i> (Brandt, 1837)	pingüim-de-testa-amarela
<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781)	pingüim-de-magalhães

Nome do Táxon	Nome em Português
PROCELLARIIFORMES Fürbringer, 1888	
DIOMEDEIDAE Gray, 1840	
<i>Phoebetria fusca</i> (Hilsenberg, 1822)	piau-preto
<i>Phoebetria palpebrata</i> (Forster, 1785)	piau-de-costas-claras
<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789)	albatroz-de-nariz-amarelo
<i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828)	albatroz-de-sobrancelha
<i>Thalassarche chrysostoma</i> (Forster, 1785)	albatroz-de-cabeça-cinza
<i>Thalassarche cauta</i> (Gould, 1841)	albatroz-arisco
<i>Diomedea epomophora</i> Lesson, 1825	albatroz-real
<i>Diomedea sanfordi</i> Murphy, 1917	albatroz-real-do-norte
<i>Diomedea exulans</i> Linnaeus, 1758	albatroz-gigante
<i>Diomedea dabbenena</i> Mathews, 1929	albatroz-de-tristão
PROCELLARIIDAE Leach, 1820	
<i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789)	petrel-gigante
<i>Macronectes halli</i> Mathews, 1912	petrel-gigante-do-norte
<i>Fulmarus glacialis</i> (Smith, 1840)	pardelão-prateado
<i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758)	pomba-do-cabo
<i>Lugensa brevirostris</i> (Lesson, 1831)	grazina-de-bico-curto
<i>Pterodroma neglecta</i> (Schlegel, 1863)	petrel-de-kermadec
<i>Pterodroma macroptera</i> (Smith, 1840)	fura-bucho-de-cara-cinza
<i>Pterodroma mollis</i> (Gould, 1844)	grazina-mole
[<i>Pterodroma hasitata</i> (Kuhl, 1820)]	
<i>Pterodroma incerta</i> (Schlegel, 1863)	grazina-de-barriga-branca
<i>Pterodroma lessonii</i> (Garnot, 1826)	grazina-de-cabeça-branca
<i>Pterodroma arminjoniana</i> (Giglioli & Salvadori, 1869)	grazina-de-trindade
<i>Halobaena caerulea</i> (Gmelin, 1789)	petrel-azul
<i>Pachyptila vittata</i> (Forster, 1777)	faigão-de-bico-largo
<i>Pachyptila desolata</i> (Gmelin, 1789)	faigão-rola
<i>Pachyptila belcheri</i> (Mathews, 1912)	faigão-de-bico-fino
[<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828)]	
<i>Procellaria cinerea</i> Gmelin, 1789	pardela-cinza
<i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758	pardela-preta
<i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844	pardela-de-óculos
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	bobo-grande
<i>Calonectris edwardsii</i> (Oustalet, 1883)	bobo-de-cabo-verde
<i>Puffinus griseus</i> (Gmelin, 1789)	bobo-escuro
<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	bobo-grande-de-sobre-branco
<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	bobo-pequeno
[<i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838]	
<i>Puffinus lherminieri</i> Lesson, 1839	pardela-de-asa-larga
HYDROBATIDAE Mathews, 1912	
<i>Fregetta grallaria</i> (Vieillot, 1818)	painho-de-barriga-branca
<i>Fregetta tropica</i> (Gould, 1844)	painho-de-barriga-preta
<i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820)	alma-de-mestre
<i>Pelagodroma marina</i> (Latham, 1790)	painho-de-ventre-branco
[<i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851)]	
<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	painho-de-cauda-furcada
PELECANOIDIDAE Gray, 1871	
<i>Pelecanoides magellani</i> (Mathews, 1912)	petrel-mergulhador-de-magalhães
PELECANIFORMES Sharpe, 1891	
PHAETHONTIDAE Brandt, 1840	
<i>Phaethon aethereus</i> Linnaeus, 1758	rabo-de-palha-de-bico-vermelho
<i>Phaethon rubricauda</i> Boddaert, 1783	rabo-de-palha-de-cauda-vermelha
<i>Phaethon lepturus</i> Daudin, 1802	rabo-de-palha-de-bico-laranja
PELECANIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Pelecanus occidentalis</i> Linnaeus, 1766	pelicano-pardo
SULIDAE Reichenbach, 1849	

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Morus capensis</i> (Lichtenstein, 1823)	atobá-do-cabo
<i>Morus serrator</i> Gray, 1843	atobá-australiano
<i>Sula dactylatra</i> Lesson, 1831	atobá-grande
<i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766)	atobá-de-pé-vermelho
<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá-pardo
PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849	
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá
[<i>Phalacrocorax bransfieldensis</i> Murphy, 1936]	
ANHINGIDAE Reichenbach, 1849	
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga
FREGATIDAE Degland & Gerbe, 1867	
<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	tesourão
<i>Fregata minor</i> (Gmelin, 1789)	tesourão-grande
<i>Fregata ariel</i> (Gray, 1845)	tesourão-pequeno
CICONIIFORMES Bonaparte, 1854	
ARDEIDAE Leach, 1820	
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	socó-boi-escuro
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	garça-da-mata
<i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766)	arapapá
<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	socoí-zigue-zague
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	socó-boi-baio
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socoí-vermelho
<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socoí-amarelo
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	garça-caranguejeira
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	garça-real-européia
[<i>Ardea herodias</i> Linnaeus, 1758]	
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura
[<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766]	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real
<i>Egretta tricolor</i> (Statius Muller, 1776)	garça-tricolor
[<i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792)]	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul
THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904	
<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	guará
<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)	caraúna-de-cara-branca
<i>Cercibis oxycerca</i> (Spix, 1825)	trombeteiro
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	tapicuru-de-cara-pelada
<i>Theristicus caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	maçarico-real
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca
[<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758]	
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro
CICONIIDAE Sundevall, 1836	
<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	maguari
<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	tuiuiú
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca
PHOENICOPTERIFORMES Fürbringer, 1888	
PHOENICOPTERIDAE Bonaparte, 1831	
<i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758	flamingo

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782	flamingo-chileno
<i>Phoenicoparrus andinus</i> (Philippi, 1854)	flamingo-grande-dos-andes
CATHARTIFORMES Seebohm, 1890	
CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839	
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei
[<i>Vultur gryphus</i> Linnaeus, 1758]	
FALCONIFORMES Bonaparte, 1831	
PANDIONIDAE Bonaparte, 1854	
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora
ACCIPITRIDAE Vigors, 1824	
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza
<i>Leptodon forbesi</i> (Swann, 1922)	gavião-de-pescoço-branco
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro
<i>Rostrhamus hamatus</i> (Temminck, 1821)	gavião-do-igapó
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	gavião-ripina
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha
<i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811)	sauveiro-do-norte
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi
<i>Circus cinereus</i> Vieillot, 1816	gavião-cinza
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	gavião-do-banhado
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	gavião-miudinho
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo
<i>Leucopternis schistaceus</i> (Sundevall, 1851)	gavião-azul
<i>Leucopternis melanops</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cara-preta
<i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850	gavião-vaqueiro
<i>Leucopternis lacermulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco
<i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	caranguejeiro
[<i>Buteogallus anthracinus</i> (Deppe, 1830)]	
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i> (Vieillot, 1817)	águia-cinzenta
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha
<i>Percnohierax leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	gavião-de-sobre-branco
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó
<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-rabo-branco
[<i>Buteo polyosoma</i> (Quoy & Gaimard, 1824)]	
<i>Buteo melanoleucus</i> (Vieillot, 1819)	águia-chilena
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	gavião-de-asa-larga
<i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	gavião-papa-gafanhoto
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	gavião-de-rabo-barrado
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	uirapu-falso

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real
<i>Spizastur melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho
FALCONIDAE Leach, 1820	
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão
<i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)	caracará-do-norte
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro
<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	chimango
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé
<i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-mateiro
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio
<i>Micrastur buckleyi</i> Swann, 1919	falcão-de-buckley
[<i>Spizapteryx circumcincta</i> (Kaup, 1852)]	
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	esmerilhão
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	falcão-de-peito-laranja
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino
GRUIFORMES Bonaparte, 1854	
ARAMIDAE Bonaparte, 1852	
<i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766)	carão
PSOPHIIDAE Bonaparte, 1831	
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	jacamim-de-costas-cinzentas
<i>Psophia leucoptera</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-brancas
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes
RALLIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Coturnicops notatus</i> (Gould, 1841)	pinto-d'água-carijó
<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	maxalalagá
<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	saracura-matraca
<i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819)	saracuruçu
<i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mangue
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes
<i>Aramides calopterus</i> Sclater & Salvin, 1878	saracura-de-asa-vermelha
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa
<i>Anurolimnas castaneiceps</i> (Sclater & Salvin, 1869)	sanã-de-cabeça-castanha
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha
<i>Laterallus fasciatus</i> (Sclater & Salvin, 1868)	sanã-zebrada
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim
<i>Laterallus jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	açanã-preta
<i>Laterallus leucopyrrhus</i> (Vieillot, 1819)	sanã-vermelha
<i>Laterallus xenopterus</i> Conover, 1934	sanã-de-cara-ruiva
<i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783)	sanã-amarela
<i>Porzana spiloptera</i> Durnford, 1877	sanã-cinza
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó
<i>Neocrex erythrops</i> (Sclater, 1867)	туру-туру
<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	saracura-carijó
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã
<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1837)	saracura-do-banhado

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum
<i>Gallinula melanops</i> (Vieillot, 1819)	frango-d'água-carijó
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul
<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	frango-d'água-pequeno
<i>Fulica armillata</i> Vieillot, 1817	carqueja-de-bico-manchado
<i>Fulica rufifrons</i> Philippi & Landbeck, 1861	carqueja-de-escudo-vermelho
<i>Fulica leucoptera</i> Vieillot, 1817	carqueja-de-bico-amarelo
HELIORNITHIDAE Gray, 1840	
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra
EURYPYGIDAE Selby, 1840	
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	pavãozinho-do-pará
CARIAMIDAE Bonaparte, 1850	
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema
CHARADRIIFORMES Huxley, 1867	
JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854	
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã
ROSTRATULIDAE Mathews, 1914	
<i>Nycticryphes semicollaris</i> (Vieillot, 1816)	narceja-de-bico-torto
HAEMATOPODIDAE Bonaparte, 1838	
<i>Haematopus palliatus</i> Temminck, 1820	piru-piru
RECURVIROSTRIDAE Bonaparte, 1831	
<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776)	pernilongo-de-costas-negras
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas
BURHINIDAE Mathews, 1912	
<i>Burhinus bistriatus</i> (Wagler, 1829)	téu-téu-da-savana
GLAREOLIDAE Brehm, 1831	
<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	perdiz-do-mar
CHARADRIIDAE Leach, 1820	
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuíra-de-esporão
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiruçu
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	batuiruçu-de-axila-preta
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	batuíra-de-bando
<i>Charadrius melodus</i> Ord, 1824	batuíra-melodiosa
<i>Charadrius wilsonia</i> Ord, 1814	batuíra-bicuda
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuíra-de-coleira
<i>Charadrius falklandicus</i> Latham, 1790	batuíra-de-coleira-dupla
<i>Charadrius modestus</i> Lichtenstein, 1823	batuíra-de-peito-tijolo
<i>Oreopholus ruficollis</i> (Wagler, 1829)	batuíra-de-papo-ferrugíneo
SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja
<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	narcejão
<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-costas-brancas
<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-bico-virado
[<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)]	
<i>Numenius borealis</i> (Forster, 1772)	maçarico-esquimó
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-galego
<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	maçarico-do-campo
[<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)]	
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-asa-branca
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado
[<i>Xenus cinereus</i> (Guldenstadt, 1775)]	
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	vira-pedras
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-papo-vermelho

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco
<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-rasteirinho
<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	maçariquinho
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco
<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	maçarico-de-bico-fino
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete
<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	maçarico-pernilongo
<i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-acanelado
[<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)]	
<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	pisa-n'água
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	falaropo-de-bico-grosso
[THINOCORIDAE Sundevall, 1836	
<i>Thinocorus rumicivorus</i> (Eöschscholtz, 1829)]	
CHIONIDAE Lesson, 1828	
<i>Chionis albus</i> (Gmelin, 1789)	pomba-antártica
STERCORARIIDAE Gray, 1870	
<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	mandrião-grande
<i>Stercorarius chilensis</i> Bonaparte, 1857	mandrião-chileno
<i>Stercorarius maccormicki</i> Saunders, 1893	mandrião-do-sul
<i>Stercorarius antarcticus</i> (Lesson, 1831)	mandrião-antártico
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	mandrião-pomarino
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	mandrião-parasítico
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	mandrião-de-cauda-comprida
LARIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Larus atlanticus</i> Olog, 1958	gaivota-de-rabo-preto
<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	gaivota-de-bico-manchado
<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823	gaivotão
<i>Larus atricilla</i> Linnaeus, 1758	gaivota-alegre
<i>Larus pipixcan</i> Wagler, 1831	gaivota-de-franklin
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	gaivota-de-cabeça-cinza
<i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivota-maria-velha
STERNIDAE Vigors, 1825	
<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-escuro
<i>Anous minutus</i> Boie, 1844	trinta-réis-preto
<i>Gygis alba</i> (Sparmann, 1786)	grazina
<i>Onychoprion fuscatus</i> (Linnaeus, 1766)	trinta-réis-das-rocas
<i>Sternula antillarum</i> Lesson, 1847	trinta-réis-miúdo
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	trinta-réis-negro
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-de-bico-preto
<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	trinta-réis-róseo
<i>Sterna hirundinacea</i> Lesson, 1831	trinta-réis-de-bico-vermelho
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	trinta-réis-boreal
<i>Sterna vittata</i> Gmelin, 1789	trinta-réis-antártico
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	trinta-réis-ártico
<i>Sterna trudeaui</i> Audubon, 1838	trinta-réis-de-coroa-branca
<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real
<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	trinta-réis-de-bando
RYNCHOPIDAE Bonaparte, 1838	
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar
COLUMBIFORMES Latham, 1790	
COLUMBIDAE Leach, 1820	
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	fogo-apagou

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui
<i>Columbina cyanopsis</i> (Pelzelin, 1870)	rolinha-do-planalto
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul
<i>Claravis godefrida</i> (Temminck, 1811)	pararu-espelho
<i>Uropelia campestris</i> (Spix, 1825)	rolinha-vaqueira
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão
<i>Patagioenas maculosa</i> (Temminck, 1813)	pomba-do-orvalho
<i>Patagioenas fasciata</i> (Say, 1823)	pomba-de-coleira-branca
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira
[<i>Geotrygon saphirina</i> Bonaparte, 1855]	
<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juriti-vermelha
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri
PSITTACIFORMES Wagler, 1830	
PSITTACIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	arara-azul-grande
<i>Anodorhynchus glaucus</i> (Vieillot, 1816)	arara-azul-pequena
<i>Anodorhynchus leari</i> Bonaparte, 1856	arara-azul-de-lear
<i>Cyanopsitta spixii</i> (Wagler, 1832)	ararinha-azul
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	maracanã-de-cara-amarela
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	maracanã-do-buriti
<i>Primolius couloni</i> (Sclater, 1876)	maracanã-de-cabeça-azul
<i>Primolius auricollis</i> (Cassin, 1853)	maracanã-de-colar
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena
<i>Guarouba guarouba</i> (Gmelin, 1788)	ararajuba
<i>Aratinga acuticaudata</i> (Vieillot, 1818)	aratinga-de-testa-azul
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã
<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	jandaia-de-testa-vermelha
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira
<i>Aratinga pintoii</i> Silveira, Lima & Höfling, 2005	cacaué
<i>Aratinga solstitialis</i> (Linnaeus, 1766)	jandaia-amarela
<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	periquito-de-cabeça-suja
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei
<i>Aratinga pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	periquito-de-bochecha-parda
<i>Aratinga cactorum</i> (Kuhl, 1820)	periquito-da-caatinga
<i>Nandayus nenday</i> (Vieillot, 1823)	periquito-de-cabeça-preta
<i>Pyrrhura cruentata</i> (Wied, 1820)	tiriba-grande
<i>Pyrrhura devillei</i> (Massena & Souancé, 1854)	tiriba-fogo
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha
<i>Pyrrhura lepida</i> (Wagler, 1832)	tiriba-pérola
<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	tiriba-de-barriga-vermelha
<i>Pyrrhura molinae</i> (Massena & Souancé, 1854)	tiriba-de-cara-suja
<i>Pyrrhura leucotis</i> (Kuhl, 1820)	tiriba-de-orelha-branca
<i>Pyrrhura griseipectus</i> Salvadori, 1900	tiriba-de-peito-cinza
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> Miranda-Ribeiro, 1920	tiriba-de-pfrimer
<i>Pyrrhura picta</i> (Statius Muller, 1776)	tiriba-de-testa-azul
<i>Pyrrhura lucianii</i> (Deville, 1851)	tiriba-de-deville

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Pyrrhura roseifrons</i> (Gray, 1859)	tiriba-de-cabeça-vermelha
<i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr
<i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	tiriba-do-madeira
<i>Pyrrhura egregia</i> (Sclater, 1881)	tiriba-de-cauda-roxa
<i>Pyrrhura melanura</i> (Spix, 1824)	tiriba-fura-mata
<i>Pyrrhura rupicola</i> (Tschudi, 1844)	tiriba-rupestre
<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	caturrita
<i>Forpus passerinus</i> (Linnaeus, 1758)	tuim-santo
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim
<i>Forpus sclateri</i> (Gray, 1859)	tuim-de-bico-escuro
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico
<i>Brotogeris versicolurus</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-de-asa-branca
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo
<i>Brotogeris cyanoptera</i> (Pelzeln, 1870)	periquito-de-asa-azul
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-testinha
<i>Nannopsittaca panychlora</i> (Salvin & Godman, 1883)	periquito-dos-tepuis
<i>Nannopsittaca dachilleae</i> O'Neill, Munn & Franke, 1991	periquito-da-amazônia
<i>Touit purpuratus</i> (Gmelin, 1788)	apuim-de-costas-azuis
<i>Touit melanonotus</i> (Wied, 1820)	apuim-de-costas-pretas
<i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)	apuim-de-asa-vermelha
<i>Touit surdus</i> (Kuhl, 1820)	apuim-de-cauda-amarela
<i>Pionites melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	marianinha-de-cabeça-preta
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela
<i>Pionopsitta vulturina</i> (Kuhl, 1820)	curica-urubu
<i>Pionopsitta aurantiocephala</i> Gaban-Lima, Raposo & Höfling, 2002	papagaio-de-cabeça-laranja
<i>Pionopsitta barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	curica-de-bochecha-laranja
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790)	curica-caica
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú
<i>Graydidascalus brachyurus</i> (Kuhl, 1820)	curica-verde
<i>Salvatoria xanthops</i> (Spix, 1824)	papagaio-galego
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde
<i>Pionus fuscus</i> (Statius Muller, 1776)	maitaca-roxa
<i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)	papagaio-charão
<i>Amazona autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-diadema
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa
[<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)]	
<i>Amazona rhodocorytha</i> (Salvadori, 1890)	chauá
<i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-da-várzea
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro
<i>Amazona kawalli</i> Grantsau & Camargo, 1989	papagaio-dos-garbes
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo
<i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã
<i>Trichloria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica
OPISTHOCOMIFORMES Sclater, 1880	
OPISTHOCOMIDAE Swainson, 1837	
<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776)	cigana
CUCULIFORMES Wagler, 1830	
CUCULIDAE Leach, 1820	
CUCULINAE Leach, 1820	
[<i>Coccyzus pumilus</i> Strickland, 1852]	
<i>Coccyzus cinereus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-cinzento
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (Wilson, 1811)	papa-lagarta-de-bico-preto

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-de-asa-vermelha
<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler
<i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788)	papa-lagarta-do-mangue
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	chincoã-de-bico-vermelho
<i>Coccyca minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincoã-pequeno
CROTOPHAGINAE Swainson, 1837	
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco
NEOMORPHINAE Shelley, 1891	
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci
<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	peixe-frito-verdadeiro
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino
<i>Neomorphus geoffroyi</i> (Temminck, 1820)	jacu-estalo
<i>Neomorphus squamiger</i> Todd, 1925	jacu-estalo-escamoso
<i>Neomorphus rufipennis</i> (Gray, 1849)	jacu-estalo-de-asa-vermelha
<i>Neomorphus pucheranii</i> (Deville, 1851)	jacu-estalo-de-bico-vermelho
STRIGIFORMES Wagler, 1830	
TYTONIDAE Mathews, 1912	
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja
STRIGIDAE Leach, 1820	
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato
<i>Megascops watsonii</i> (Cassin, 1849)	corujinha-orelhuda
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio
<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo
<i>Megascops sanctaecatarinae</i> (Salvin, 1897)	corujinha-do-sul
<i>Megascops guatemalae</i> (Sharpe, 1875)	corujinha-de-roraima
<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela
<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta
<i>Glaucidium hardyi</i> Vieillard, 1990	caburé-da-amazônia
<i>Glaucidium mooreorum</i> Silva, Coelho & Gonzaga, 2002	caburé-de-pernambuco
<i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830)	caburé-miudinho
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira
<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	caburé-acanelado
<i>Rhinoptynx clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	mocho-dos-banhados
CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881	
STEATORNITHIDAE Bonaparte, 1842	
<i>Steatornis caripensis</i> Humboldt, 1817	guácharo
NYCTIBIDAE Chenu & Des Murs, 1851	
<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua-gigante
<i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)	mãe-da-lua-parda
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua
<i>Nyctibius leucopterus</i> (Wied, 1821)	urutau-de-asa-branca
<i>Nyctibius bracteatus</i> Gould, 1846	urutau-ferrugem
CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825	
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju
<i>Chordeiles pusillus</i> Gould, 1861	bacurauzinho

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	bacurau-da-praia
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano
<i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825)	bacurau-de-cauda-barrada
<i>Nyctiprogne vielliardi</i> (Lencioni-Neto, 1994)	bacurau-do-são-francisco
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corucão
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado
<i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783	joão-corta-pau
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (Cassin, 1849)	bacurau-rabo-de-seda
<i>Caprimulgus longirostris</i> Bonaparte, 1825	bacurau-da-telha
<i>Caprimulgus cayennensis</i> Gmelin, 1789	bacurau-de-cauda-branca
<i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-chintã
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848	bacurau-de-lajeado
<i>Caprimulgus whitelyi</i> (Salvin, 1885)	bacurau-dos-tepuis
<i>Caprimulgus hirundinaceus</i> Spix, 1825	bacurauzinho-da-caatinga
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura
<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante
<i>Eleothreptus anomalus</i> (Gould, 1838)	curiango-do-banhado
<i>Eleothreptus candicans</i> (Pelzeln, 1867)	bacurau-de-rabo-branco
APODIFORMES Peters, 1940	
APODIDAE Olphe-Galliard, 1887	
[<i>Cypseloides cryptus</i> Zimmer, 1945]	
[<i>Cypseloides lemosi</i> Eisenmann & Lehmann, 1962]	
<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto
<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	taperuçu-velho
<i>Streptoprocne phelpsi</i> (Collins, 1972)	taperuçu-dos-tepuis
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca
<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866)	taperuçu-de-coleira-falha
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzentos
<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	taperá-de-garganta-branca
[<i>Chaetura pelagica</i> (Linnaeus, 1758)]	
<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-de-chapman
<i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916	andorinhão-da-amazônia
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto
<i>Aeronautes montivagus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	andorinhão-serrano
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador
TROCHILIDAE Vigors, 1825	
PHAETHORNITHINAE Jardine, 1833	
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado
<i>Glaucis dohrnii</i> (Bourcier & Mulsant, 1852)	balança-rabo-canela
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto
<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	balança-rabo-de-garganta-preta
<i>Threnetes niger</i> (Linnaeus, 1758)	balança-rabo-escuro
<i>Anopetia gounellei</i> (Boucard, 1891)	rabo-branco-de-cauda-larga
<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	rabo-branco-pequeno
<i>Phaethornis maranhaoensis</i> Grantsau, 1968	rabo-branco-do-maranhão
<i>Phaethornis rufumii</i> Boucard, 1892	rabo-branco-do-rupununi
<i>Phaethornis aethopyga</i> Zimmer, 1950	rabo-branco-de-garganta-escuro
<i>Phaethornis idaliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1856)	rabo-branco-mirim
<i>Phaethornis nattereri</i> Berlepsch, 1887	besourão-de-sobre-amarelo
<i>Phaethornis griseogularis</i> Gould, 1851	rabo-branco-de-garganta-cinza

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro
<i>Phaethornis subochraceus</i> Todd, 1915	rabo-branco-de-barriga-fulva
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabo-branco-cinza
<i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847)	rabo-branco-amarelo
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-bico-reto
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes
<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	besourão-de-bico-grande
<i>Phaethornis margarettae</i> Ruschi, 1972	rabo-branco-de-margarette
TROCHILINAE Vigors, 1825	
<i>Doryfera johannae</i> (Bourcier, 1847)	bico-de-lança
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza
<i>Campylopterus hyperythrus</i> Cabanis, 1848	asa-de-sabre-canela
<i>Campylopterus duidae</i> Chapman, 1929	asa-de-sabre-de-peito-camurça
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto
<i>Colibri delphinae</i> (Lesson, 1839)	beija-flor-marrom
<i>Colibri coruscans</i> (Gould, 1846)	beija-flor-violeta
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta
<i>Anthracothorax viridigula</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-de-veste-verde
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta
<i>Avocettula recurvirostris</i> (Swainson, 1822)	beija-flor-de-bico-virado
<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-brilho-de-fogo
<i>Topaza pyra</i> (Gould, 1846)	topázio-de-fogo
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho
<i>Stephanoxis lalandi</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-topete
<i>Lophornis ornatus</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-de-leque-canela
<i>Lophornis gouldii</i> (Lesson, 1833)	topetinho-do-brasil-central
<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	topetinho-vermelho
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1823)	topetinho-verde
<i>Lophornis pavoninus</i> Salvin, & Godman, 1882	topetinho-pavão
<i>Discosura langsdorffi</i> (Temminck, 1821)	rabo-de-espinho
<i>Discosura longicaudus</i> (Gmelin, 1788)	bandeirinha
<i>Chlorestes notata</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul
<i>Chlorostilbon mellisugus</i> (Linnaeus, 1758)	esmeralda-de-cauda-azul
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde
<i>Thalurania watertonii</i> (Bourcier, 1847)	beija-flor-de-costas-violetas
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo
<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado
<i>Chrysuronia oenone</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-cauda-dourada
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo
<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	beija-flor-dos-tepuis
<i>Leucippus chlorocercus</i> Gould, 1866	beija-flor-verde
<i>Amazilia chionogaster</i> (Tschudi, 1845)	beija-flor-verde-e-branco
<i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-barriga-branca
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca
<i>Amazilia rondoniae</i> Ruschi, 1982	beija-flor-de-cabeça-azul
<i>Amazilia brevirostris</i> (Lesson, 1829)	beija-flor-de-bico-preto
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Amazilia viridigaster</i> (Bourcier, 1843)	beija-flor-de-barriga-verde
<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi
<i>Heliodoxa xanthogonys</i> Salvin & Godman, 1882	brilhante-veludo
<i>Heliodoxa schreibersii</i> (Bourcier, 1847)	brilhante-de-garganta-preta
<i>Heliodoxa aurescens</i> (Gould, 1846)	beija-flor-estrela
<i>Augastes scutatus</i> (Temminck, 1824)	beija-flor-de-gravata-verde
<i>Augastes lumachella</i> (Lesson, 1838)	beija-flor-de-gravata-vermelha
<i>Heliathryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul
<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	chifre-de-ouro
<i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	bico-reto-cinzento
<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	bico-reto-de-banda-branca
<i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812)	bico-reto-azul
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista
TROGONIFORMES A. O. U., 1886	
TROGONIDAE Lesson, 1828	
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-pequeno
<i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817	surucuá-de-coleira
<i>Trogon personatus</i> Gould, 1842	surucuá-mascarado
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta
<i>Pharomachrus pavoninus</i> (Spix, 1824)	surucuá-pavão
CORACIIFORMES Forbes, 1844	
ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho
MOMOTIDAE Gray, 1840	
<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	udu-de-bico-largo
<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	juruva-ruiva
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul
GALBULIFORMES Fürbringer, 1888	
GALBULIDAE Vigors, 1825	
<i>Galbalcyrhynchus leucotis</i> Des Murs, 1845	ariramba-vermelha
<i>Galbalcyrhynchus purusianus</i> Goeldi, 1904	sovela-vermelha
<i>Brachygalba albogularis</i> (Spix, 1824)	agulha-de-garganta-branca
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	ariramba-preta
<i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Vieillot, 1817)	cuitelão
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790	ariramba-de-bico-amarelo
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva
<i>Galbula galbula</i> (Linnaeus, 1766)	ariramba-de-cauda-verde
<i>Galbula tombacea</i> Spix, 1824	ariramba-de-barba-branca
<i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849	ariramba-da-capoeira
<i>Galbula chalcothorax</i> Sclater, 1854	ariramba-violácea
<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	ariramba-bronzeada
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paraíso
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamarauçu
BUCCONIDAE Horsfield, 1821	
<i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788)	macuru-de-testa-branca
<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	macuru-de-pescoço-branco
<i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846)	macuru-de-barriga-castanha

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Notharchus ordii</i> (Cassin, 1851)	macuru-de-peito-marrom
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado
<i>Bucco macrodactylus</i> (Spix, 1824)	rapazinho-de-boné-vermelho
<i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788	rapazinho-carijó
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	rapazinho-de-colar
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo
<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	rapazinho-dos-velhos
<i>Nystalus striatipectus</i> (Sclater, 1854)	rapazinho-do-chaco
<i>Malacoptila fusca</i> (Gmelin, 1788)	barbudo-pardo
<i>Malacoptila semicincta</i> Todd, 1925	barbudo-de-coleira
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem
<i>Micromonacha lanceolata</i> (Deville, 1849)	macuru-papa-mosca
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	macuru
<i>Nonnula sclateri</i> Hellmayr, 1907	freirinha-amarelada
<i>Nonnula ruficapilla</i> (Tschudi, 1844)	freirinha-de-coroa-castanha
<i>Nonnula amaurocephala</i> Chapman, 1921	freirinha-de-cabeça-castanha
<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1783)	chora-chuva-de-asa-branca
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca
<i>Monasa flavirostris</i> Strickland, 1850	chora-chuva-de-bico-amarelo
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho
PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810	
CAPITONIDAE Bonaparte, 1838	
<i>Capito aurovirens</i> (Cuvier, 1829)	capitão-de-coroa
<i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916	capitão-de-cinta
<i>Capito brunneipectus</i> Chapman, 1921	capitão-de-peito-marrom
<i>Capito niger</i> (Statius Muller, 1776)	capitão-de-bigode-carijó
<i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)	capitão-de-fronte-dourada
<i>Eubucco richardsoni</i> (Gray, 1846)	capitão-de-bigode-limão
<i>Eubucco tucinkae</i> (Seilern, 1913)	capitão-de-colar-amarelo
RAMPHASTIDAE Vigors, 1825	
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1778	tucano-grande-de-papo-branco
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde
<i>Aulacorhynchus prasinus</i> (Gould, 1834)	tucaninho-de-nariz-amarelo
<i>Aulacorhynchus derbianus</i> Gould, 1835	tucaninho-verde
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	araçari-negro
<i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827)	saripoca-de-coleira
<i>Selenidera nattereri</i> (Gould, 1836)	saripoca-de-bico-castanho
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766)	araçari-miudinho
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho
<i>Pteroglossus azara</i> (Vieillot, 1819)	araçari-de-bico-de-marfim
<i>Pteroglossus mariae</i> Gould, 1854	araçari-de-bico-marrom
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho
<i>Pteroglossus pluricinctus</i> Gould, 1835	araçari-de-cinta-dupla
<i>Pteroglossus beauharnaesii</i> Wagler, 1832	araçari-mulato
PICIDAE Leach, 1820	
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-dourado
<i>Picumnus pumilus</i> Cabanis & Heine, 1863	pica-pau-anão-do-orinoco

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Picumnus lafresnayi</i> Malherbe, 1862	pica-pau-anão-do-amazonas
<i>Picumnus exilis</i> (Lichtenstein, 1823)	pica-pau-anão-de-pintas-amarelas
<i>Picumnus spilogaster</i> Sundevall, 1866	pica-pau-anão-de-pescoço-branco
<i>Picumnus pygmaeus</i> (Lichtenstein, 1823)	pica-pau-anão-pintado
<i>Picumnus varzeae</i> Snethlage, 1912	pica-pau-anão-da-várzea
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira
<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840	pica-pau-anão-escamado
<i>Picumnus fuscus</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-fusco
<i>Picumnus rufiventris</i> Bonaparte, 1838	pica-pau-anão-vermelho
<i>Picumnus fulvescens</i> Stager, 1961	pica-pau-anão-canela
<i>Picumnus limae</i> Snethlage, 1924	pica-pau-anão-da-caatinga
<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	pica-pau-anão-carijó
<i>Picumnus castelnau</i> Malherbe, 1862	pica-pau-anão-creme
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito-de-testa-amarela
<i>Melanerpes cactorum</i> (d'Orbigny, 1840)	pica-pau-de-testa-branca
<i>Picoides mixtus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-chorão
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	picapauzinho-anão
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó
<i>Veniliornis kirkii</i> (Malherbe, 1845)	pica-pau-de-sobre-vermelho
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado
<i>Veniliornis cassini</i> (Malherbe, 1862)	pica-pau-de-colar-dourado
<i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824)	picapauzinho-de-testa-pintada
<i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	pica-pau-de-garganta-branca
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro
<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado
<i>Piculus rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	pica-pau-oliváceo
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-peito-pontilhado
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo
<i>Celeus undatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-barrado
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	picapauzinho-chocolate
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate
<i>Celeus lugubris</i> (Malherbe, 1851)	pica-pau-louro
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo
<i>Celeus spectabilis</i> Sclater & Salvin, 1880	pica-pau-lindo
<i>Celeus obrieni</i> Short, 1973	pica-pau-do-parnaíba
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira
<i>Dryocopus galeatus</i> (Temminck, 1822)	pica-pau-de-cara-canela
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho
<i>Campephilus leucopogon</i> (Valenciennes, 1826)	pica-pau-de-barriga-preta
PASSERIFORMES Linné, 1758	
TYRANNI Wetmore & Miller, 1926	
FURNARIIDA Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988	
MELANOPAREIIDAE Irestedt, Fjeldså, Johansson & Ericson, 2002	
<i>Melanopareia torquata</i> (Wied, 1831)	tapaculo-de-colarinho
THAMNOPHILOIDEA Swainson, 1824	
THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824	
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado
<i>Cymbilaimus sanctaemariae</i> Gyldenstolpe, 1941	choca-do-bambu

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara
<i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816)	borralhara-do-norte
<i>Frederickena unduligera</i> (Pelzeln, 1868)	borralhara-ondulada
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	chorá-boi
<i>Sakesphorus canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	choca-de-crista-preta
<i>Sakesphorus cristatus</i> (Wied, 1831)	choca-do-nordeste
<i>Sakesphorus melanothorax</i> (Sclater, 1857)	choca-de-cauda-pintada
<i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-d'água
<i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	papo-branco
<i>Thamnophilus doliatu</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada
<i>Thamnophilus nigrocinereus</i> Sclater, 1855	choca-preta-e-cinza
<i>Thamnophilus cryptoleucus</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	choca-selada
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-oho-vermelho
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868	choca-murina
<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	choca-bate-cabo
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer
<i>Thamnophilus sticturus</i> Pelzeln, 1868	choca-da-bolívia
<i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924	choca-do-planalto
<i>Thamnophilus ambiguus</i> Swainson, 1825	choca-de-sooretama
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela
<i>Thamnophilus divisorius</i> Whitney, Oren & Brumfield, 2004	choca-do-acre
<i>Thamnophilus insignis</i> Salvin & Godman, 1884	choca-de-roraima
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata
<i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825	choca-de-asa-vermelha
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho
<i>Megastictus margaritatus</i> (Sclater, 1855)	choca-pintada
<i>Neotantes niger</i> (Pelzeln, 1859)	choca-preta
<i>Clytactantes atrogularis</i> Lanyon, Stotz & Willard, 1991	choca-de-garganta-preta
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa
<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	choquinha-de-asa-ferrugem
<i>Dysithamnus plumbeus</i> (Wied, 1831)	choquinha-chumbo
<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1867)	uirapuru-de-garganta-preta
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878)	uirapuru-selado
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipecuá
<i>Thamnomanes schistogynus</i> Hellmayr, 1911	uirapuru-azul
<i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora
<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881	choquinha-de-barriga-parda
<i>Myrmotherula leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	choquinha-de-olho-branco
<i>Myrmotherula haematonota</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-carijó
<i>Myrmotherula ornata</i> Sclater, 1853	choquinha-ornada
<i>Myrmotherula erythrura</i> Sclater, 1890	choquinha-de-cauda-ruiva
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda
<i>Myrmotherula ignota</i> Griscom, 1929	choquinha-de-bico-curto
<i>Myrmotherula ambigua</i> Zimmer, 1932	choquinha-de-coroa-listrada
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneath, 1912	choquinha-de-garganta-amarela
<i>Myrmotherula surinamensis</i> (Gmelin, 1788)	choquinha-estriada
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia
<i>Myrmotherula cherriei</i> Berlepsch & Hartert, 1902	choquinha-de-peito-riscado
<i>Myrmotherula klagesi</i> Todd, 1927	choquinha-do-tapajós
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara
<i>Myrmotherula guttata</i> (Vieillot, 1825)	choquinha-de-barriga-ruiva

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco
<i>Myrmotherula sunensis</i> Chapman, 1925	choquinha-do-oeste
<i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864	choquinha-pequena
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida
<i>Myrmotherula urosticta</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-rabo-cintado
<i>Myrmotherula iheringi</i> Snethlage, 1914	choquinha-de-ihering
<i>Myrmotherula fluminensis</i> Gonzaga, 1988	choquinha-fluminense
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Menetries, 1835)	choquinha-cinzenta
<i>Myrmotherula snowi</i> Teixeira & Gonzaga, 1985	choquinha-de-alagoas
<i>Myrmotherula behni</i> Berlepsch & Leverkuhn, 1890	choquinha-de-asa-lisa
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza
<i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-da-várzea
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquinha
<i>Myrmorchilus strigilatus</i> (Wied, 1831)	piu-piu
<i>Herpsilochmus sellowi</i> Whitney & Pacheco, 2000	chorozinho-da-caatinga
<i>Herpsilochmus pileatus</i> (Lichtenstein, 1823)	corozinho-de-boné
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto
<i>Herpsilochmus sticturus</i> Salvin, 1885	chorozinho-de-cauda-pintada
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927	chorozinho-de-cabeça-pintada
<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-costas-manchadas
<i>Herpsilochmus roraimae</i> Hellmayr, 1903	chorozinho-de-roraima
<i>Herpsilochmus pectoralis</i> Sclater, 1857	chorozinho-de-papo-preto
<i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-bico-comprido
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha
<i>Microrhophias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	papa-formiga-de-bando
<i>Formicivora iheringi</i> Hellmayr, 1909	formigueiro-do-nordeste
<i>Formicivora erythronotos</i> Hartlaub, 1852	formigueiro-de-cabeça-negra
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo
<i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929	formigueiro-da-serra
<i>Formicivora littoralis</i> Gonzaga & Pacheco, 1990	formigueiro-do-litoral
<i>Formicivora melanogaster</i> Pelzeln, 1868	formigueiro-de-barriga-preta
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho
<i>Stymphalornis acutirostris</i> Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995	bicudinho-do-brejo
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada
<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni
<i>Drymophila genei</i> (Filippi, 1847)	choquinha-da-serra
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho
<i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	trovoada-listrada
<i>Terenura sicki</i> Teixeira & Gonzaga, 1983	zidedê-do-nordeste
<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)	zidedê
<i>Terenura humeralis</i> Sclater & Salvin, 1880	zidedê-de-encontro
<i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881	zidedê-de-asa-cinza
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocuí
<i>Cercomacra brasiliiana</i> Hellmayr, 1905	chororó-cinzento
<i>Cercomacra tyrannina</i> (Sclater, 1855)	chororá-escuro
<i>Cercomacra laeta</i> Todd, 1920	chororó-didi
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro
<i>Cercomacra serva</i> (Sclater, 1858)	chororó-preto
<i>Cercomacra carbonaria</i> Sclater & Salvin, 1873	chororó-do-rio-branco
<i>Cercomacra melanaria</i> (Menetries, 1835)	chororó-do-pantanal
<i>Cercomacra manu</i> Fitzpatrick & Willard, 1990	chororó-de-manu
<i>Cercomacra ferdinandi</i> Snethlage, 1928	chororó-de-goíás
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	papa-taoca
<i>Pyriglena atra</i> (Swainson, 1825)	papa-taoca-da-bahia

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul
<i>Rhopornis ardesiacus</i> (Wied, 1831)	gravatazeiro
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	papa-formiga-de-sobrancelha
<i>Myrmoborus lugubris</i> (Cabanis, 1847)	formigueiro-liso
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta
[<i>Myrmoborus melanurus</i> (Sclater & Salvin, 1866)]	
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-cantador
<i>Hypocnemis hypoxantha</i> Sclater, 1869	cantador-amarelo
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa
<i>Hypocnemoides melanopogon</i> (Sclater, 1857)	solta-asa-do-norte
<i>Myrmochanes hemileucus</i> (Sclater & Salvin, 1866)	formigueiro-preto-e-branco
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789)	formigueiro-de-cabeça-preta
<i>Percnostola minor</i> Pelzeln, 1868	formigueiro-de-pelzeln
<i>Percnostola lophotes</i> Hellmayr & Seilern, 1914	formigueiro-do-bambu
<i>Schistocichla schistacea</i> (Sclater, 1858)	formigueiro-cinza
<i>Schistocichla leucostigma</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-de-asa-pintada
<i>Schistocichla caurensis</i> (Hellmayr, 1906)	formigueiro-do-caura
<i>Myrmeciza longipes</i> (Swainson, 1825)	formigueiro-de-barriga-branca
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Muller, 1776)	formigueiro-ferrugem
<i>Myrmeciza ruficauda</i> (Wied, 1831)	formigueiro-de-cauda-ruiva
<i>Myrmeciza loricata</i> (Lichtenstein, 1823)	formigueiro-assobiador
<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota
<i>Myrmeciza pelzelni</i> Sclater, 1890	formigueiro-de-barriga-cinza
<i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857	formigueiro-de-cauda-castanha
<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	formigueiro-de-peito-preto
<i>Myrmeciza melanoceps</i> (Spix, 1825)	formigueiro-grande
<i>Myrmeciza goeldii</i> (Snethlage, 1908)	formigueiro-de-goeldi
<i>Myrmeciza hyperythra</i> (Sclater, 1855)	formigueiro-chumbo
<i>Myrmeciza fortis</i> (Sclater & Salvin, 1868)	formigueiro-de-taoca
<i>Myrmeciza disjuncta</i> Friedmann, 1945	formigueiro-de-yapacana
<i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783)	pinto-do-mato-carijó
<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766)	papa-formiga-de-topete
<i>Gymnopathys leucaspis</i> (Sclater, 1855)	mãe-de-taoca-bochecuda
<i>Gymnopathys rufigula</i> (Boddaert, 1783)	mãe-de-taoca-de-garganta-vermelha
<i>Gymnopathys salvini</i> (Berlepsch, 1901)	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada
<i>Rhegmatorhina gymnops</i> Ridgway, 1888	mãe-de-taoca-de-cara-branca
<i>Rhegmatorhina berlepschi</i> (Snethlage, 1907)	mãe-de-taoca-arlequim
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-papuda
<i>Rhegmatorhina cristata</i> (Pelzeln, 1868)	mãe-de-taoca-cristada
<i>Rhegmatorhina melanosticta</i> (Sclater & Salvin, 1880)	mãe-de-taoca-cabeçuda
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea
<i>Hylophylax poecilnotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca
<i>Phlegopsis erythroptera</i> (Gould, 1855)	mãe-de-taoca-avermelhada
<i>Skutchia borbae</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-dourada
CONOPOPHAGIDAE Sclater & Salvin, 1873	
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta
<i>Conopophaga roberti</i> Hellmayr, 1905	chupa-dente-de-capuz
<i>Conopophaga melanogaster</i> Menetries, 1835	chupa-dente-grande
<i>Conopophaga peruviana</i> Des Murs, 1856	chupa-dente-do-peru
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	cuspidor-de-máscara-preta
FURNARIOIDEA Gray, 1840	
GRALLARIIDAE Sclater & Salvin, 1873	
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu

Nome do Taxon	Nome em Português
<i>Grallaria eludens</i> Lowery & O'Neill, 1969	tovacuçu-xodó
<i>Hylopezus macularius</i> (Temminck, 1823)	torom-carijó
<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	torom-torom
<i>Hylopezus ochroleucus</i> (Wied, 1831)	torom-do-nordeste
<i>Hylopezus nattereri</i> Pinto, 1937	pinto-do-mato
<i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)	tovaca-patinho
<i>Myrmothera simplex</i> (Salvin & Godman, 1884)	torom-de-peito-pardo
RHINOCRYPTIDAE Wetmore, 1930	
<i>Liosceles thoracicus</i> (Sclater, 1865)	corneteiro-da-mata
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétriès, 1835)	tapaculo-pintado
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830	entufado
<i>Merulaxis stresemanni</i> Sick, 1960	entufado-baiano
<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétriès, 1835)	tapaculo-preto
<i>Scytalopus iraiensis</i> Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998	macuquinho-da-várzea
<i>Scytalopus novacapitalis</i> Sick, 1958	tapaculo-de-brasília
<i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho
<i>Scytalopus psychopompus</i> Teixeira & Carnevalli, 1989	macuquinho-baiano
FORMICARIIDAE Gray, 1840	
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta
<i>Formicarius rufifrons</i> Blake, 1957	pinto-domato-de-fronte-ruiva
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha
<i>Chamaeza nobilis</i> Gould, 1855	tovaca-estriada
<i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825	tovaca-cantadora
<i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis & Heine, 1859)	tovaca-de-rabo-vermelho
SCLERURIDAE Swainson, 1827	
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho
<i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto
<i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)	vira-folha-pardo
<i>Sclerurus albigularis</i> Sclater & Salvin, 1869	vira-folha-de-garganta-cinza
<i>Sclerurus scansor</i> (Menetries, 1835)	vira-folha
<i>Geositta poeciloptera</i> (Wied, 1830)	andarilho
<i>Geositta cunicularia</i> (Vieillot, 1816)	curriqueiro
DENDROCOLAPTIDAE Gray, 1840	
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	arapaçu-da-taoca
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha
<i>Drymornis bridgesii</i> (Eyton, 1850)	arapaçu-platino
<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-bico-comprido
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha
<i>Hylexetastes stresemanni</i> Sneathlage, 1925	arapaçu-de-barriga-pintada
<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)	arapaçu-de-bico-vermelho
<i>Hylexetastes uniformis</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-uniforme
<i>Hylexetastes brigidai</i> Silva, Novaes & Oren, 1996	arapaçu-deloro-cinza
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	arapaçu-vermelho
<i>Xiphocolaptes carajaensis</i> Silva, Novaes & Oren, 2002	arapaçu-do-carajás
<i>Xiphocolaptes falcirostris</i> (Spix, 1824)	arapaçu-do-nordeste
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca
<i>Xiphocolaptes major</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-campo
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado
<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-marrom
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Xiphorhynchus picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco
<i>Xiphorhynchus kienerii</i> (Des Murs, 1855)	arapaçu-ferrugem
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i> (Spix, 1824)	arapaçu-ocelado
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-assobiador
<i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-elegante
<i>Xiphorhynchus spixii</i> (Lesson, 1830)	arapaçu-de-spix
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-riscado
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (Des Murs, 1849)	arapaçu-listrado
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado
<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	arapaçu-escamado
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamado-do-sul
<i>Lepidocolaptes wagleri</i> (Spix, 1824)	arapaçu-de-wagler
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845)	arapaçu-de-listras-brancas
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-beija-flor
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	arapaçu-de-bico-torto
<i>Campylorhamphus procurvoides</i> (Lafresnaye, 1850)	arapaçu-de-bico-curvo
FURNARIIDAE Gray, 1840	
<i>Cinclodes fuscus</i> (Vieillot, 1818)	pedreiro-dos-andes
<i>Cinclodes pabsti</i> Sick, 1969	pedreiro
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama
<i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838	casaca-de-couro-amarelo
<i>Furnarius torridus</i> Sclater & Salvin, 1866	joão-de-bico-pálido
<i>Furnarius minor</i> Pelzeln, 1858	joãozinho
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro
<i>Limmornis curvirostris</i> Gould, 1839	junqueiro-de-bico-curvo
<i>Limnocites rectirostris</i> (Gould, 1839)	junqueiro-de-bico-reto
<i>Phleocryptes melanops</i> (Vieillot, 1817)	bate-bico
<i>Leptasthenura platensis</i> Reichenbach, 1853	rabudinho
<i>Leptasthenura striolata</i> (Pelzeln, 1856)	grimpeirinho
<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	grimpeiro
<i>Spartonoica maluroides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	boinha
<i>Oreophylax moreirae</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	garrincha-chorona
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817)	bichoita
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichoré
<i>Synallaxis cinerea</i> Wied, 1831	joão-baiano
<i>Synallaxis infuscata</i> Pinto, 1950	tatac
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi
<i>Synallaxis albigularis</i> Sclater, 1858	joão-de-peito-escuro
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném
<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874	joão-grilo
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joão-teneném-castanho
<i>Synallaxis cherriei</i> Gyldenstolpe, 1930	puruchém
<i>Synallaxis propinqua</i> Pelzeln, 1859	joão-de-barriga-branca
<i>Synallaxis macconnelli</i> Chubb, 1919	joão-escuro
<i>Synallaxis cabanisi</i> Berlepsch & Leverkuhn, 1890	joão-do-norte
<i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	joão-teneném-becuá
<i>Synallaxis albilora</i> Pelzeln, 1856	joão-do-pantanal
<i>Synallaxis simoni</i> Hellmayr, 1907	joão-do-araguaia
<i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859	estrelinha-preta
<i>Synallaxis kollari</i> Pelzeln, 1856	joão-de-barba-grisalha
<i>Gyalophylax hellmayri</i> (Reiser, 1905)	joão-chique-chique
<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	arredio-do-rio
<i>Cranioleuca vulpecula</i> (Sclater & Salvin, 1866)	arredio-de-peito-branco

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Cranioleuca sulphurifera</i> (Burmeister, 1869)	arredio-de-papo-manchado
<i>Cranioleuca pyrrophia</i> (Vieillot, 1818)	arredio
<i>Cranioleuca obsolata</i> (Reichenbach, 1853)	arredio-oliváceo
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido
<i>Cranioleuca semicinerea</i> (Reichenbach, 1853)	joão-de-cabeça-cinza
<i>Cranioleuca demissa</i> (Salvin & Godman, 1884)	joão-do-tepui
<i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	joão-pintado
<i>Cranioleuca muelleri</i> (Hellmayr, 1911)	joão-escamoso
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié
<i>Certhiaxis mustelinus</i> (Sclater, 1874)	joão-da-canarana
<i>Thripophaga macroura</i> (Wied, 1821)	rabo-amarelo
<i>Thripophaga fusciceps</i> Sclater, 1889	joão-liso
<i>Asthenes hudsoni</i> (Sclater, 1874)	joão-platino
[<i>Asthenes pyrroleuca</i> (Vieillot, 1817)]	
<i>Asthenes baeri</i> (Berlepsch, 1906)	lenheiro
<i>Asthenes luizae</i> Vielliard, 1990	lenheiro-da-serra-do-cipó
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau
<i>Phacellodomus striaticollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	tio-tio
<i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817)	graveteiro
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> (Wied, 1821)	joão-botina-da-mata
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (Pelzeln, 1859)	cisqueiro
<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	cochicho
<i>Coryphistera alaudina</i> Burmeister, 1860	corredor-crestudo
<i>Metopothrix aurantiaca</i> Sclater & Salvin, 1866	joão-folheiro
<i>Acroatornis fonsecai</i> Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996	acrobata
<i>Roraimia adusta</i> (Salvin & Godman, 1884)	joão-de-roraima
<i>Pseudoseisura cristata</i> (Spix, 1824)	casaca-de-couro
<i>Pseudoseisura unirufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	casaca-de-couro-da-caatinga
<i>Pseudoseisura lophotes</i> (Reichenbach, 1853)	coperete
<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	limpa-folha-do-buriti
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete
<i>Simoxenops ucayalae</i> (Chapman, 1928)	limpa-folha-de-bico-virado
<i>Ancistrops strigilatus</i> (Spix, 1825)	limpa-folha-picanço
<i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)	limpa-folha-riscado
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiva
<i>Philydor erythrocerum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo
<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	limpa-folha-de-asa-castanha
<i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859	limpa-folha-ocráceo
<i>Philydor novaesi</i> Teixeira & Gonzaga, 1983	limpa-folha-do-nordeste
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia
<i>Philydor pyrroides</i> (Cabanis, 1848)	limpa-folha-vermelho
<i>Philydor dimidiatum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-do-brejo
<i>Anabazenops dorsalis</i> (Sclater & Salvin, 1880)	barranqueiro-de-topete
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	trepador-coleira
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barranqueiro-camurça
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)	barranqueiro-pardo
<i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902	barranqueiro-do-pará
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco
<i>Automolus melanopezus</i> (Sclater, 1858)	barranqueiro-escuro
<i>Automolus roraimae</i> Hellmayr, 1917	barranqueiro-de-roraima
<i>Automolus rubiginosus</i> (Sclater, 1857)	barranqueiro-ferrugem
<i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)	barranqueiro-de-coroa-castanha
<i>Hylocryptus rectirostris</i> (Wied, 1831)	fura-barreira

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	trepadorzinho
<i>Xenops milleri</i> (Chapman, 1914)	bico-virado-da-copa
<i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859	bico-virado-fino
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó
<i>Megaxenops parnaguae</i> Reiser, 1905	bico-virado-da-caatinga
TYRANNIDA Wetmore & Miller, 1926	
TYRANNIDAE Vigors, 1825	
PIPROMORPHINAE Bonaparte, 1853	
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)	abre-asa-da-mata
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte
<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921)	maria-fiteira
<i>Lophotriccus eulophotes</i> Todd, 1925	maria-topetuda
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	caga-sebinho-de-penacho
<i>Atalotriccus pilaris</i> (Cabanis, 1847)	maria-de-olho-claro
<i>Hemitriccus minor</i> (Snethlage, 1907)	maria-sebinha
<i>Hemitriccus flammulatus</i> Berlepsch, 1901	maria-de-peito-machetado
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso
<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	catraca
<i>Hemitriccus josephinae</i> (Chubb, 1914)	maria-bicudinha
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868)	maria-de-olho-branco
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Snethlage, 1907)	maria-de-barriga-branca
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato
<i>Hemitriccus iohannis</i> (Snethlage, 1907)	maria-peruviana
<i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853)	sebinho-rajado-amarelo
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro
<i>Hemitriccus inornatus</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-campina
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim
<i>Hemitriccus mirandae</i> (Snethlage, 1925)	maria-do-nordeste
<i>Hemitriccus kaempferi</i> (Zimmer, 1953)	maria-catarinense
<i>Hemitriccus furcatus</i> (Lafresnaye, 1846)	papa-moscas-estrela
<i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)	maria-piçaça
<i>Poecilotriccus senex</i> (Pelzeln, 1868)	maria-do-madeira
<i>Poecilotriccus russatus</i> (Salvin & Godman, 1884)	ferreirinho-ferrugem
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó
<i>Poecilotriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853)	ferreirinho-de-testa-parda
<i>Poecilotriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	ferreirinho-de-cara-parda
<i>Poecilotriccus sylvia</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-da-capoeira
<i>Taeniotriccus andrei</i> (Berlepsch & Hartert, 1902)	maria-bonita
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio
<i>Todirostrum pictum</i> Salvin, 1897	ferreirinho-de-sobrancelha
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850	ferreirinho-pintado
ELAENIINAE Cabanis & Heine, 1856	
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador
<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	piolhinho-verdoso
<i>Phyllomyias reiseri</i> Hellmayr, 1905	piolhinho-do-grotão
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho
<i>Phyllomyias griseiceps</i> (Sclater & Salvin, 1871)	piolhinho-de-cabeça-cinza
<i>Phyllomyias griseocapilla</i> Sclater, 1862	piolhinho-serrano

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta
<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	guaracava-de-penacho-amarelo
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande
<i>Elaenia ridleyana</i> Sharpe, 1888	cocoruta
<i>Elaenia albiceps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-crista-branca
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque
<i>Elaenia pelzelni</i> Berlepsch, 1907	guaracava-do-rio
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum
<i>Elaenia ruficeps</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-vermelho
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão
<i>Elaenia pallatangae</i> Sclater, 1862	guaracava-serrana
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha
<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-cinzento
<i>Suiriri islerorum</i> Zimmer, Whittaker & Oren, 2001	suiriri-da-chapada
<i>Mecocerculus leucophrys</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	alegrinho-de-garganta-branca
<i>Serpophaga hypoleuca</i> Sclater & Salvin, 1866	alegrio-do-rio
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)	joão-pobre
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho
<i>Serpophaga</i> sp. ["griseiceps" <i>sensu</i> Straneck, 1993]	alegrinho-trinador
<i>Serpophaga munda</i> Berlepsch, 1893	alegrinho-de-barriga-branca
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bageiro
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela
<i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817)	papa-moscas-canela
<i>Polystictus superciliaris</i> (Wied, 1831)	papa-moscas-de-costas-cinzentas
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892)	tricolino
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> (Sclater & Salvin, 1873)	tricolino-oliváceo
<i>Pseudocolopteryx dinelliana</i> Lillo, 1905	tricolino-pardo
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> (d'Orbigny e Lafresnaye)	amarelinho-do-junco
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento
<i>Euscarthmus rufomarginatus</i> (Pelzeln, 1868)	maria-corruíra
<i>Stigmatura napensis</i> Chapman, 1926	papa-moscas-do-sertão
<i>Stigmatura budytoides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	alegrinho-balança-rabo
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina
<i>Phylloscartes chapmani</i> Gilliard, 1940	barbudinho-do-tepui
<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato
<i>Phylloscartes ceciliae</i> Teixeira, 1987	cara-pintada
<i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992	maria-da-restinga
<i>Phylloscartes beckeri</i> Gonzaga & Pacheco, 1995	borboletinha-baiana
<i>Phylloscartes virescens</i> Todd, 1925	borboletinha-guianense
<i>Phylloscartes nigrifrons</i> (Salvin & Godman, 1884)	maria-de-testa-preta
<i>Phylloscartes roquettei</i> Sneath, 1928	cara-dourada
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar
<i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887)	papa-moscas-de-olheiras
<i>Phylloscartes difficilis</i> (Ihering & Ihering, 1907)	estalinho
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	maria-pequena
<i>Sublegatus obscurior</i> Todd, 1920	sertanejo-escuro
<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	guaracava-modesta
<i>Inezia inornata</i> (Salvadori, 1897)	alegrinho-do-chaco
<i>Inezia subflava</i> (Sclater & Salvin, 1873)	amarelinho

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Inezia caudata</i> (Salvin, 1897)	amarelinho-da-amazônia
<i>Tachuris rubrigastra</i> (Vieillot, 1817)	papa-piri
<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	papa-moscas-do-campo
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula
<i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860)	flautim-pardo
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo
<i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882	patinho-escuro
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho
<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858	patinho-de-coroa-dourada
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca
<i>Platyrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831	patinho-gigante
FLUVICOLINAE Swainson, 1832	
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque
<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-leque-do-sudeste
<i>Myiophobus roraimae</i> (Salvin & Godman, 1883)	felipe-do-tepui
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho
<i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863	assadinho-de-cauda-preta
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru
<i>Neopipo cinnamomea</i> (Lawrence, 1869)	enferrujadinho
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu
<i>Empidonax traillii</i> (Audubon, 1828)	maria-fibiu
<i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895	papa-moscas-de-alder
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	piui-boreal
<i>Contopus fumigatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	piui-de-topete
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piui-verdadeiro
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzentos
<i>Contopus albogularis</i> (Berlioz, 1962)	piui-queixado
<i>Contopus nigrescens</i> (Sclater & Salvin, 1880)	piui-preto
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe
<i>Lessonia rufa</i> (Gmelin, 1789)	colegial
<i>Knipolegus striaticeps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-preta-acinzentada
<i>Knipolegus hudsoni</i> Sclater, 1872	maria-preta-do-sul
<i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868)	pretinho-do-igapó
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado
<i>Knipolegus poecilurus</i> (Sclater, 1862)	maria-preta-de-cauda-ruiva
<i>Knipolegus orenocensis</i> Berlepsch, 1864	maria-preta-ribeirinha
<i>Knipolegus aterrimus</i> Kaup, 1853	maria-preta-bate-rabo
<i>Knipolegus franciscanus</i> Sneath, 1928	maria-preta-do-nordeste
<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828	maria-preta-de-penacho
<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha
<i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789)	viuvinha-deóculos
<i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-praia
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i> Sclater & Salvin, 1866	gaúcha-d'água
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera
<i>Xolmis coronatus</i> (Vieillot, 1823)	noivinha-coroada
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca
<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823)	noivinha
<i>Xolmis dominicanus</i> (Vieillot, 1823)	noivinha-de-rabo-preto

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Neoxolmis rufiventris</i> (Vieillot, 1823)	gaúcho-chocolate
<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	tesoura-do-brejo
<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta
<i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)	lavadeira-do-norte
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha
<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	galito
<i>Alectrurus risora</i> (Vieillot, 1824)	tesoura-do-campo
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha
<i>Machetormis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro
TYRANNINAE Vigors, 1825	
<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho
<i>Myiozetetes granadensis</i> Lawrence, 1862	bem-te-vi-de-cabeça-cinza
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bem-te-vi-pequeno
<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	bem-te-vi-da-copa
<i>Myiodynastes luteiventris</i> Sclater, 1859	bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1766)	suiriri-valente
[<i>Tyrannus dominicensis</i> (Gmelin, 1788)]	
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissíá
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	vissíá-cantor
<i>Syrstes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro
<i>Casiornis fuscus</i> Sclater & Salvin, 1873	caneleiro-enxofre
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
<i>Ramphotricon megacephalum</i> (Swainson, 1835)	maria-cabeçuda
<i>Ramphotricon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho
<i>Ramphotricon fuscicauda</i> Chapman, 1925	maria-de-cauca-escuro
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	capitão-castanho
<i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)	tinguaçu-ferrugem
<i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859	tinguaçu-de-barriga-amarela
<i>Attila bolivianus</i> Lafresnaye, 1848	bzte-pára
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo
OXYRUNCIDAE Ridgway, 1906	
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto
COTINGIDAE Bonaparte, 1849	
PHYTOTOMINAE Swainson, 1837	
<i>Phytotoma rutila</i> Vieillot, 1818	corta-ramos
RUPICOLINAE Bonaparte, 1853	
<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	galo-da-serra

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	saurá
<i>Phoenicircus nigricollis</i> Swainson, 1832	saurá-de-pescoço-preto
COTINGINAE Bonaparte, 1849	
<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	tesourinha-da-mata
<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	sabiá-pimenta
[<i>Pipreola whitelyi</i> Salvin & Godman, 1884]	
<i>Cotinga maynana</i> (Linnaeus, 1766)	cotinga-azul
<i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-de-peito-roxo
<i>Cotinga maculata</i> (Statius Muller, 1776)	crejoá
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul
<i>Procnias albus</i> (Hermann, 1783)	araponga-da-amazônia
<i>Procnias averano</i> (Hermann, 1783)	araponga-do-nordeste
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga
<i>Tijuca atra</i> Ferrusac, 1829	saudade
<i>Tijuca condita</i> Snow, 1980	saudade-de-asa-cinza
<i>Calyptura cristata</i> (Vieillot, 1818)	tietê-de-coroa
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	tropeiro-da-serra
<i>Lipaugus streptophorus</i> (Salvin & Godman, 1884)	cricrió-de-cinta-vermelha
<i>Conioptilon mcilhennyi</i> Lowery & O'Neill, 1966	anambé-de-cara-preta
<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i> (Deville & Sclater, 1852)	cotinga-de-garganta-encarnada
<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	anambé-pompadora
<i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839)	anambé-de-rabo-branco
<i>Xipholena atropurpurea</i> (Wied, 1820)	anambé-de-asa-branca
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-uma
<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	anambé-militar
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó
<i>Perissocephalus tricolor</i> (Statius Muller, 1776)	maú
<i>Cephalopterus ornatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809	anambé-preto
PIPRIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão
<i>Neopelma chrysocephalum</i> (Pelzeln, 1868)	fruxu-do-carrasco
<i>Neopelma aurifrons</i> (Wied, 1831)	fruxu-baiano
<i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944	fruxu
<i>Neopelma sulphureiventer</i> (Hellmayr, 1903)	fruxu-de-barriga-amarela
<i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho
<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868)	uirapuruzinho-do-norte
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo
<i>Piprites pileata</i> (Temminck, 1822)	caneleirinho-de-chapéu-preto
<i>Illicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766)	dançarino-de-garganta-branca
<i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819)	tangará-rajado
<i>Machaeropterus striolatus</i> (Bonaparte, 1838)	tangará-riscado
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	uirapuru-cigarra
<i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)	uirapuru-de-chapéu-azul
<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	uirapuru-de-chapéu-branco
<i>Lepidothrix vilasboasi</i> (Sick, 1959)	dançador-de-coroa-dourada
<i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851)	cabeça-de-prata
<i>Lepidothrix serena</i> (Linnaeus, 1766)	uirapuru-estrela
<i>Lepidothrix suavissima</i> (Salvin & Godman, 1882)	dançador-do-tepui
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira
<i>Antilophia bokermanni</i> Coelho & Silva, 1998	soldadinho-do-araripe
<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	soldadinho
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Xenopipo uniformis</i> (Salvin & Godman, 1884)	dançarino-oliváceo
<i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847	pretinho
[<i>Heterocercus aurantiivertex</i> Sclater & Salvin, 1880]	
<i>Heterocercus flavivertex</i> Pelzeln, 1868	dançarino-de-crista-amarela
<i>Heterocercus linteatus</i> (Strickland, 1850)	coroa-de-fogo
<i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-branca
<i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758)	uirapuru-vermelho
<i>Pipra filicauda</i> Spix, 1825	rabo-de-aramé
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja
<i>Pipra cornuta</i> Spix, 1825	dançador-de-crista
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-de-ouro
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada
<i>Pipra chloromeros</i> Tschudi, 1844	dançador-de-cauda-graduada
TITYRIDAE Gray, 1840	
<i>Schiffornis major</i> Des Murs, 1856	flautim-ruivo
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza
<i>Laniisoma elegans</i> (Thunberg, 1823)	chibante
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa
<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	anambé-fusco
<i>Iodopleura pipra</i> (Lesson, 1831)	anambezinho
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde
<i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)	caneleiro-cinzento
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado
<i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	caneleiro-da-guiana
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto
<i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869)	tijerila
PASSERI Linné, 1758	
CORVIDA Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988	
VIREONIDAE Swainson, 1837	
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhão
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara
<i>Vireo gracilirostris</i> Sharpe, 1890	juruviara-de-noronha
<i>Vireo flavoviridis</i> (Cassin, 1851)	juruviara-verde-amarelada
<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	juruviara-barbuda
<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado
<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea
<i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866	vite-vite-de-cabeça-cinza
<i>Hylophilus sclateri</i> Salvin & Godman, 1883	vite-vite-do-tepui
<i>Hylophilus brunneiceps</i> Sclater, 1866	vite-vite-de-cabeça-marrom
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-marela
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859	vite-vite-uirapuru
CORVIDAE Leach, 1820	
<i>Cyanocorax violaceus</i> Du Bus, 1847	gralha-violácea
<i>Cyanocorax cyanomelas</i> (Vieillot, 1818)	gralha-do-pantanal
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo
<i>Cyanocorax cayanus</i> (Linnaeus, 1766)	gralha-da-guiana
<i>Cyanocorax heilprini</i> Gentry, 1885	gralha-de-nuca-azul
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-piçaça
<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	gralha-cancã
PASSERIDA Linné, 1758	
HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco
<i>Tachycineta meyeni</i> (Cabanis, 1850)	andorinha-chilena
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo
<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande
<i>Progne elegans</i> Baird, 1865	andorinha-do-sul
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril
<i>Atticora melanoleuca</i> (Wied, 1820)	andoriha-de-coleira
<i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853)	calcinha-branca
<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-dorso-acanelado
TROGLODYTIDAE Swainson, 1831	
<i>Campylorhynchus griseus</i> (Swainson, 1838)	garrincha-dos-lhanos
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau
<i>Odontorchilus cinereus</i> (Pelzeln, 1868)	cambaxirra-cinzenta
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	corruíra-do-campo
<i>Thryothorus genibarbis</i> Swainson, 1838	garrinchão-pai-avô
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789)	garrinchão-coraia
<i>Thryothorus leucotis</i> Lafresnaye, 1845	garrinchão-de-barriga-vermelha
<i>Thryothorus guarayanus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	garrincha-do-oeste
<i>Thryothorus longirostris</i> Vieillot, 1819	garrinchão-de-bico-grande
<i>Thryothorus griseus</i> (Todd, 1925)	garrincha-cinza
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra
<i>Troglodytes rufulus</i> Cabanis, 1849	corruíra-do-tepui
<i>Henicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847)	uirapuru-de-peito-branco
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado
<i>Microcerculus ustulatus</i> Salvin & Godman, 1883	flautista-do-tepui
<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783)	uirapuru-de-asa-branca
<i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783)	uirapuru-verdadeiro
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim
POLIOPTILIDAE Baird, 1858	
<i>Microbates collaris</i> (Pelzeln, 1868)	bico-assovelado-de-coleira
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado
<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-chapéu-preto
<i>Polioptila lactea</i> Sharpe, 1885	balança-rabo-leitoso
<i>Polioptila guianensis</i> Todd, 1920	balança-rabo-da-copa
<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	balança-rabo-de-máscara
TURDIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Cichlopsis leucogenys</i> Cabanis, 1851	sabiá-castanho
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	sabiá-norte-americano
<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)	sabiá-de-cara-cinza
<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	sabiá-de-óculos
<i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una
<i>Platycichla leucops</i> (Taczanowski, 1877)	sabiá-preto
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Turdus olivater</i> (Lafresnaye, 1848)	sabiá-de-cabeça-preta
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca
<i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858	caraxué-de-bico-preto
<i>Turdus lawrencii</i> Coues, 1880	caraxué-de-bico-amarelo
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata
<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	sabiá-bicolor
<i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848	caraxué
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira
MIMIDAE Bonaparte, 1853	
<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)	sabiá-da-praia
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo
<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	calhandra-de-três-rabos
MOTACILLIDAE Horsfield, 1821	
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor
<i>Anthus furcatus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	caminheiro-de-unha-curta
<i>Anthus correndera</i> Vieillot, 1818	caminheiro-de-espora
<i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878	caminheiro-grande
<i>Anthus hellmayri</i> Hartert, 1909	caminheiro-de-barriga-acanelada
COEREBIDAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica
THRAUPIDAE Cabanis, 1847	
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga
<i>Conothraupis speculigera</i> (Gould, 1855)	tiê-preto-e-branco
<i>Conothraupis mesoleuca</i> (Berlioz, 1939)	tiê-bicudo
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho
<i>Compsothraupis loricata</i> (Lichtenstein, 1819)	carretão
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto
<i>Nemosia rourei</i> Cabanis, 1870	saíra-apunhalada
<i>Mitrospingus oleagineus</i> (Salvin, 1886)	pipira-olivácea
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário
<i>Pyrrhocoma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha
<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	bandoleta
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaçu-de-fogo
<i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758)	sanhaçu-vermelho
<i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, 1789)	sanhaçu-escarlata
<i>Piranga leucoptera</i> Trudeau, 1839	sanhaçu-de-asa-branca
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo
<i>Tachyphonus nattereri</i> Pelzeln, 1870	pipira-de-natterer
<i>Tachyphonus rufiventer</i> (Spix, 1825)	tem-tem-de-crista-amarela
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	tem-tem-de-topete-ferrugíneo
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta
<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	tem-tem-de-dragona-vermelha
<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-parda
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca
<i>Ramphocelus nigrogularis</i> (Spix, 1825)	pipira-de-máscara
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-de-máscara

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento
<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul
<i>Thraupis ornata</i> (Sparrman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro
<i>Thraupis bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	sanhaçu-papa-laranja
<i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)	pipira-azul
<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaçu-frade
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva
<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	cigarra-do-campo
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando
<i>Tangara brasiliensis</i> (Linnaeus, 1766)	cambada-de-chaves
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia
<i>Tangara fastuosa</i> (Lesson, 1831)	pintor-verdadeiro
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores
<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta
<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819)	saíra-douradinha
<i>Tangara schrankii</i> (Spix, 1825)	saíra-ouro
<i>Tangara xanthogastra</i> (Sclater, 1851)	saíra-de-barriga-amarela
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-negaça
<i>Tangara guttata</i> (Cabanis, 1850)	saíra-pintada
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-carijó
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-de-cabeça-castanha
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa
<i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saíra-de-cabeça-azul
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada
<i>Tangara cyanoptera</i> (Swainson, 1834)	saíra-de-cabeça-preta
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-diamante
<i>Tangara callophrys</i> (Cabanis, 1849)	saíra-opala
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha
<i>Dacnis albiventris</i> (Sclater, 1852)	saí-de-barriga-branca
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta
<i>Dacnis flaviventer</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	saí-amarela
<i>Dacnis nigripes</i> Pelzeln, 1856	saí-de- pernas-pretas
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)	saí-de-bico-curto
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho
<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue
<i>Conirostrum margaritae</i> (Holt, 1931)	figuinha-amazônica
<i>Diglossa duidae</i> Chapman, 1929	fura-flor-escamado
<i>Diglossa major</i> Cabanis, 1849	fura-flor-escamado
EMBERIZIDAE Vigors, 1825	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	cigarrinha-do-campo
<i>Porphyrospiza caerulescens</i> (Wied, 1830)	campainha-azul
<i>Phrygilus fruticeti</i> (Kittlitz, 1833)	canário-andino-negro

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Diuca diuca</i> (Molina, 1782)	diuca
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu
<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	tico-tico-do-banhado
<i>Poospiza thoracica</i> (Nordmann, 1835)	peito-pinhão
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	quem-te-vestiu
<i>Poospiza lateralis</i> (Nordmann, 1835)	quete
<i>Poospiza melanoleuca</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	capacetininho
<i>Poospiza cinerea</i> Bonaparte, 1850	capacetininho-do-oco-do-pau
<i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870	canário-rasteiro
<i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851	canário-do-amazonas
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro
<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	tipio
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo
<i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907	canário-do-brejo
<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	sabiá-do-banhado
<i>Embernagra longicauda</i> Strickland, 1844	rabo-mole-da-serra
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó
<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte
<i>Sporophila intermedia</i> Cabanis, 1851	papa-capim-cinza
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	patativa
<i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789)	coleiro-do-norte
<i>Sporophila murallae</i> Chapman, 1915	papa-capim-de-caquetá
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo
<i>Sporophila bouvronides</i> (Lesson, 1831)	estrela-do-norte
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho
<i>Sporophila luctuosa</i> (Lafresnaye, 1843)	papa-capim-preto-e-branco
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano
<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894)	papa-capim-de-costas-cinzas
<i>Sporophila melanops</i> (Pelzeln, 1870)	papa-capim-do-bananal
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho
<i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825)	golinho
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão
<i>Sporophila nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caboclinho-do-sertão
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho
<i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)	caboclinho-lindo
<i>Sporophila hypoxantha</i> Cabanis, 1851	caboclinho-de-barriga-vermelha
<i>Sporophila ruficollis</i> Cabanis, 1851	caboclinho-de-papo-escuro
<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)	caboclinho-de-papo-branco
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	caboclinho-de-peito-castanho
<i>Sporophila hypochroma</i> Todd, 1915	caboclinho-de-sobre-ferrugem
<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	caboclinho-de-chapéu-cinzento
[<i>Sporophila zelichi</i> Naroski, 1977]	
<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	caboclinho-de-barriga-preta
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió
<i>Sporophila crassirostris</i> (Gmelin, 1789)	bicudinho
<i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851)	bicudo
<i>Amaurospiza moesta</i> (Hartlaub, 1853)	negrinho-do-mato
<i>Dolospingus fringilloides</i> (Pelzeln, 1870)	papa-capim-de-coleira
<i>Catamenia homochroa</i> Sclater, 1859	patativa-da-amazônia
<i>Tiaris obscurus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	cigarra-parda
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro
<i>Arremonops conirostris</i> (Bonaparte, 1850)	tico-tico-cantor
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto
<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato
<i>Arremon franciscanus</i> Raposo, 1997	tico-tico-do-são-francisco

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838	tico-tico-de-bico-amarelo
<i>Atlapetes personatus</i> (Cabanis, 1848)	tico-tico-do-tepui
<i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905	mineirinho
<i>Coryphasiza melanotis</i> (Temminck, 1822)	tico-tico-de-máscara-negra
<i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei
<i>Gubernatrix cristata</i> (Vieillot, 1817)	cardeal-amarelo
<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	cardeal
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia
<i>Paroaria baeri</i> Hellmayr, 1907	cardeal-de-goias
<i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	cavalaria
CARDINALIDAE Ridgway, 1901	
<i>Pheucticus aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	rei-do-bosque
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	furriel
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro
<i>Periporphyrus erythromelas</i> (Gmelin, 1789)	bicudo-encarnado
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	pimentão
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	sabiá-congá
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro
<i>Saltator maxillosus</i> Cabanis, 1851	bico-grosso
<i>Saltator aurantirostris</i> Vieillot, 1817	bico-duro
<i>Saltator atricollis</i> Vieillot, 1817	bico-de-pimenta
<i>Cyanoloxia glaucocerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	azulinho
<i>Cyanocompsa cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia
<i>Cyanocompsa brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão
<i>Spiza americana</i> (Gmelin, 1789)	papa-capim-americano
PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947	
<i>Parula pitaiyumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita
<i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766)	mariquita-amarela
<i>Dendroica striata</i> (Forster, 1772)	mariquita-de-perna-clara
<i>Dendroica fusca</i> (Statius Muller, 1776)	mariquita-papo-de-fogo
[<i>Dendroica cerulea</i> (Wilson, 1810)]	
[<i>Dendroica virens</i> (Gmelin, 1789)]	
<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	mariquita-de-rabo-vermelho
[<i>Protonotaria citrea</i> (Boddaert, 1783)]	
<i>Seiurus noveboracensis</i> (Gmelin, 1789)	mariquita-boreal
<i>Oporornis agilis</i> (Wilson, 1812)	mariquita-de-connecticut
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra
<i>Myioborus miniatus</i> (Swainson, 1827)	mariquita-cinza
<i>Myioborus castaneocapillus</i> (Cabanis, 1849)	mariquita-de-cabeça-parda
<i>Basileuterus bivittatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pula-pula-de-duas-fitas
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula
<i>Basileuterus hypoleucus</i> Bonaparte, 1830	pula-pula-de-barriga-branca
<i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865)	canário-do-mato
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador
<i>Basileuterus leucophrys</i> Pelzeln, 1868	pula-pula-de-sobrancelha
<i>Phaeothlypis fulvicauda</i> (Spix, 1825)	pula-pula-de-cauda-avermelhada
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato
ICTERIDAE Vigors, 1825	
<i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, 1824)	japu-pardo
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	japuaçu
<i>Clypicterus oseryi</i> (Deville, 1849)	japu-de-capacete
<i>Ocyalus latirostris</i> (Swainson, 1838)	japu-de-rabo-verde
<i>Cacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro
<i>Icterus chryscephalus</i> (Linnaeus, 1766)	rouxinol-do-rio-negro
[<i>Icterus galbula</i> (Linnaeus, 1758)]	
<i>Icterus nigrogularis</i> (Hahn, 1819)	joão-pinto-amarelo
<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	corrupião
<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	joão-pinto
<i>Macroagelaius imthurni</i> (Sclater, 1881)	iraúna-da-guiana
<i>Gymnomystax mexicanus</i> (Linnaeus, 1766)	iratauí-grande
<i>Lamprosar tanagrinus</i> (Spix, 1824)	iraúna-velada
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna
<i>Curaeus forbesi</i> (Sclater, 1886)	anumará
<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	cardeal-do-banhado
<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	carretão
<i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782)	sargento
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi
<i>Chrysomus icterocephalus</i> (Linnaeus, 1766)	iratauí-pequeno
<i>Xanthopsar flavus</i> (Gmelin, 1788)	veste-amarela
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo
<i>Pseudoleistes virescens</i> (Vieillot, 1819)	dragão
<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	asa-de-telha
<i>Agelaioides fringillarius</i> (Spix, 1824)	asa-de-telha-pálido
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866	vira-bosta-picumã
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta
<i>Quiscalus lugubris</i> Swainson, 1838	iraúna-do-norte
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul
<i>Sturnella defilippii</i> (Bonaparte, 1850)	peito-vermelho-grande
<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	pedro-ceroulo
<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	triste-pia
FRINGILLIDAE Leach, 1820	
[<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)]	
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	pintassilgo-europeu
<i>Carduelis yarrellii</i> Audubon, 1839	pintassilgo-do-nordeste
<i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo
<i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855	gaturamo-anão
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim
<i>Euphonia finschi</i> Sclater & Salvin, 1877	gaturamo-capim
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro
<i>Euphonia lanirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	gaturamo-de-bico-grosso
<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	cais-cais
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	gaturamo-de-barriga-branca
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte
<i>Euphonia cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	gaturamo-preto
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	bandeirinha
ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850	

Nome do Táxon	Nome em Português
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre
PASSERIDAE Rafinesque, 1815	
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO

Presidente Emérito:

Fernando da Costa Novaes (1927-2004)

Membros honorários:

Edwin O'Neill Willis
 Hélio Ferraz de Almeida Camargo
 José Hidasi
 Rolf Grantsau
 Walter Adolfo Voss
 William Belton

Núcleo Administrativo:

José Fernando Pacheco - coordenador
 Luiz Fernando de Andrade Figueiredo - sub-coordenador
 Dimas Pioli - secretário

Núcleo de Redatores:

Alberto Urben Filho	Glaysen Ariel Bencke
Alexandre Aleixo	Gustavo Sigrist Betini
Ana Beatriz Aroeira Soares	Iury Accordi
Fábio Olmos	Sônia Aline Roda
Francisco Mallet-Rodrigues	Vítor de Queiroz Piacentini
Giovanni Nightingal Mauricio	

Conselho Consultivo:

Bret M. Whitney	Luís Fábio Silveira
Fernando Costa Straube	Marcos Ricardo Bornschein
Herculano Alvarenga	Mario Cohn-Haft
João Luiz Xavier do Nascimento	Ricardo Parrini
Juan Mazar Barnett	Rudi Ricardo Laps
Jules R. Soto	