



# NATTERERIA

Boletim do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos

Nº 5  
20 de março de 2002

## Deliberações do CBRO

**Resolução Nº 91** – REDEFINIR A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE *Pernostola rufifrons* (Gmelin, 1789), DA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, POR DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 56.

Os limites geográficos de *Pernostola rufifrons* passam a ser aqueles atribuídos à forma nominada e a *P. r. subcristata*, caso *P. minor* (antes *P. r. minor*) seja considerada espécie plena reunindo os táxons subespecíficos *P. m. minor* e *P. minor jensoni*, este endêmico do Peru (Capparella *et al.* 1997).

**Resolução Nº 92** – REDEFINIR A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE *Myrmeciza loricata* (Lichtenstein, 1823), DA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, POR DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 57.

Os limites geográficos de *Myrmeciza loricata*, considerando *M. squamosa* como espécie independente, tornam a ser aqueles estritamente relacionados à forma nominada (Pinto 1978:396; Ridgely & Tudor 1994:336-7).

**Resolução Nº 93** – SUBSTITUIR *Synallaxis whitneyi* Pacheco & Gonzaga, 1995 POR *Synallaxis cinerea* Wied, 1831, NA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS.

Whitney & Pacheco (2001) demonstraram, após o reexame direto dos síntipos depositados no AMNH, que o nome *S. cinerea* é válido e tem prioridade nomenclatural sobre *S. whitneyi*.

**Resolução Nº 94** – REDEFINIR A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE *Cranioleuca vulpina* (Pelzeln, 1856), DA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, POR DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 59.

Os limites geográficos de *Cranioleuca vulpina*, considerando *C. vulpecula* como espécie independente e parcialmente simpátrica, passam a ser aqueles atribuídos aos táxons subespecíficos *C. v. vulpina*, *C. v. alopecias*, *C. v. reiseri*, *C. v. apurensis* e *C. v. foxi* (Zimmer 1997), dos quais apenas os dois últimos não ocorrem no Brasil.

**Resolução Nº 95** – REDEFINIR A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE *Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824), DA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, POR DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 60.

Os limites geográficos de *Pseudoseisura cristata*, considerando *P. unirufa* como espécie independente, tornam a ser aqueles especificamente atribuídos à forma nominada (Pinto 1978:324; Zimmer & Whittaker 2000b).

**Resolução Nº 96** – INCLUIR *Lepidocolaptes wagleri* Hellmayr, 1907 NA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, INSERINDO-O IMEDIATAMENTE APÓS *Lepidocolaptes falcinellus* (Cabanis & Heine, 1859).

Evidências obtidas em análises morfológicas, biogeográficas (Silva & Straube 1996) e filogenéticas (García-Moreno & Silva 1997) sugerem que *L. wagleri* deve ser considerado independente de *L. squamatus*, considerando os conceitos de 'espécie filogenética' ou de 'espécie evolutiva'.

## Deliberations of the CBRO

**Resolution 91** – REDEFINE THE GEOGRAPHICAL RANGE OF BLACK-HEADED ANTBIRD *Pernostola rufifrons* IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, AS A CONSEQUENCE OF RESOLUTION 56.

With Amazonas Antbird *P. minor* (formerly *P. r. minor*) now considered a species, with subspecies *P. m. minor* e *P. minor jensoni*, this last endemic to Peru (Capparella *et al.* 1997), the geographical range of Black-headed Antbird becomes that attributed to the nominate form and *P. r. subcristata*.

**Resolution 92** – REDEFINE THE GEOGRAPHICAL RANGE OF WHITE-BIBBED ANTBIRD *Myrmeciza loricata* IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, AS A CONSEQUENCE OF RESOLUTION 57.

With Squamate Antbird *M. squamosa* now considered a species, the geographical range of White-bibbed Antbird becomes that of the nominate form (Pinto 1978:396; Ridgely & Tudor 1994:336-7).

**Resolution 93** – REPLACE *Synallaxis whitneyi* Pacheco & Gonzaga, 1995 IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS BY *Synallaxis cinerea* Wied, 1831.

Whitney & Pacheco (2001) demonstrated, after re-examining the syntypes in the AMNH, that the name *S. cinerea* is valid and has nomenclatural priority over *S. whitneyi*.

**Resolution 94** – REDEFINE THE GEOGRAPHICAL RANGE OF RUSTY-BACKED SPINETAIL *Cranioleuca vulpina* IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, AS A CONSEQUENCE OF RESOLUTION 59.

With Parker's Spinetail *C. vulpecula* now considered a species, partially sympatric with Rusty-backed Spinetail, the geographical range of Rusty-backed Spinetail becomes that of the taxa *C. v. vulpina*, *C. v. alopecias*, *C. v. reiseri*, *C. v. apurensis* e *C. v. foxi* (Zimmer 1997), of which all but the last two occur in Brazil.

**Resolution 95** – REDEFINE THE GEOGRAPHICAL RANGE OF CAATINGA CACHOLOTE *Pseudoseisura cristata* IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, AS A CONSEQUENCE OF RESOLUTION 60.

With Gray-crested Cacholote *P. unirufa* now considered a species, the geographical range of Caatinga Cacholote becomes that of the nominate form (Pinto 1978:324; Zimmer & Whittaker 2000b).

**Resolution 96** – ADD WAGLER'S WOODCREEPER *Lepidocolaptes wagleri* TO THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, IMMEDIATELY AFTER SCALLOPED WOODCREEPER *L. falcinellus*.

Morphological, biogeographical (Silva & Straube 1996) and phylogenetic (García-Moreno & Silva 1997) evidence suggests that Wagler's Woodcreeper should be separated from Scaled Woodcreeper *L. squamatus*, according to both the phylogenetic and evolutionary species concepts.

**Resolução Nº 97** – REDEFINIR A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE *Lepidocolaptes squamatus* (Lichtenstein, 1822), DA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, POR DECORRÊNCIA DAS RESOLUÇÕES Nº 61 e 96.

Os limites geográficos de *Lepidocolaptes squamatus*, considerando *L. wagleri* e *L. falcinellus* como espécies independentes, tornam a ser aqueles especificamente atribuídos à forma nominada (Pinto 1978:295; Clements 2000:292).

**Resolução Nº 98** – INCLUIR *Suiriri islerorum* Zimmer Whittaker & Oren, 2001 NA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, INSERINDO-O IMEDIATAMENTE APÓS *Suiriri suiriri* (Vieillot, 1818).

Espécie nova, críptica, descrita para o bioma do Cerrado, Brasil e região adjacente da Bolívia (Zimmer *et al.* 2001) com plumagem bastante semelhante a *S. suiriri affinis* e que muitas vezes ocorrem sintopicamente.

**Resolução Nº 99** – REDEFINIR A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE *Inezia subflava* (Sclater & Salvin, 1873), DA LISTA PRINCIPAL DE AVES BRASILEIRAS, POR DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 62.

Os limites geográficos de *Inezia subflava* passam a ser aqueles atribuídos à forma nominada (endêmica ao Brasil) e a *I. s. obscura*, caso *I. caudata* (antes *I. s. caudata*) seja considerada espécie plena reunindo os táxons subespecíficos *I. c. caudata* e *I. c. intermedia* (Traylor 1979:43-4; Zimmer & Whittaker 2000a).

**Resolution 97** – REDEFINE THE GEOGRAPHICAL RANGE OF SCALED WOODCREEPER *Lepidocolaptes squamatus* IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, AS A CONSEQUENCE OF RESOLUTIONS Nº 61 AND 96.

With Wagler's Woodcreeper *L. wagleri* and Scalloped Woodcreeper *L. falcinellus* now considered species, the geographical range of Scaled Woodcreeper becomes that of the nominate form (Pinto 1978:295; Clements 2000:292).

**Resolution 98** – ADD CHAPADA FLYCATCHER *Suiriri islerorum* TO THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS IMMEDIATELY AFTER SUIRIRI FLYCATCHER *S. suiriri*.

A new, cryptic species, described for the Brazilian Cerrado biome and adjacent region in Bolivia (Zimmer *et al.* 2001), with plumage very similar to that of *S. suiriri affinis* with which it often occurs syntopically.

**Resolution 99** – REDEFINE THE GEOGRAPHICAL RANGE OF AMAZONIAN INEZIA *Inezia subflava* IN THE PRIMARY LIST OF BRAZILIAN BIRDS, AS A CONSEQUENCE OF RESOLUTION 62.

With Paled-tipped Inezia *I. caudata* (formerly *I. s. caudata*) now considered a species, with subspecies *I. c. caudata* and *I. c. intermedia*, the geographical range of Amazonian Inezia becomes that of the nominate form (endemic to Brazil) and *I. s. obscura*, (Traylor 1979:43-4; Zimmer & Whittaker 2000a).

## Referências Bibliográficas / References

- Capparella, A. P., G. H. Rosenberg & S. W. Cardiff (1997) A new subspecies of *Percnostola rufifrons* (Formicariidae) from northeastern amazonian Peru, with revision of the *rufifrons* complex. Pp.165-170. In: *Studies in Neotropical Ornithology honoring Ted Parker* (J. V. Remsen, Jr., ed.). Washington, D.C.:American Ornithologists' Union. (Ornithol. Monogr. No. 48).
- Clements, J. F. (2000) *Birds of the world: A checklist. Fifth Edition*. Vista, CA: Ibis Publishing Company.
- García-Moreno, J. & J. M. C. Silva (1997) An interplay between forest and non-forest South American avifaunas suggested by a phylogeny of *Lepidocolaptes* Woodcreepers (Dendrocolaptinae). *Stud Neotrop Fauna & Environm* 32:164-173.
- Pinto, O. M. O. (1978) *Novo Catálogo das aves do Brasil*. Primeira Parte. São Paulo: Empr. Gráf. Revista dos Tribunais.
- Ridgely, R. S. & G. Tudor (1994) *The Birds of South America, Volume II, The Suboscine Passerines*. Austin: University of Texas Press.
- Silva, J. M. C. & F. C. Straube (1996) Systematics and biogeography of Scaled Woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). *Stud Neotrop Fauna & Environm* 31(1):3-10.
- Traylor, M. A., Jr. (1979) Subfamily Elaeniinae. Pp. 3-112. In: *Check-List of Birds of the world. Vol. VIII. A continuation of the work of James L. Peters* (M. A. Traylor, ed.). Cambridge, Mass.:Museum of Comparative Zoology.
- Whitney, B. M. & J. F. Pacheco (2001) *Synallaxis whitneyi* Pacheco and Gonzaga, 1995 is a synonym of *Synallaxis cinerea* Wied, 1831. *Nattereria* 2:34-35.
- Zimmer, K. J. (1997) Species limits in *Cranioleuca vulpina*. Pp.849-864. In: *Studies in Neotropical Ornithology honoring Ted Parker* (J. V. Remsen, Jr., ed.). Washington, D.C.:American Ornithologists' Union. (Ornithol. Monogr. No. 48).
- Zimmer, K. J. & A. Whittaker (2000a) Species limits in Pale-tipped Tyrannulets (*Inezia*: Tyrannidae). *Wilson Bull.* 112(1):51-66.
- Zimmer, K. J. & A. Whittaker (2000b) The Rufous Cachalote (Furnariidae: *Pseudoseisura*) is two species. *Condor* 102(2):409-422.
- Zimmer, K. J., A. Whittaker & D. C. Oren (2001) A cryptic new species of Flycatcher (Tyrannidae: *Suiriri*) from the Cerrado region of central South America. *Auk* 118(1):56-78.



CBRO - COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS  
Brazilian Ornithological Records Committee  
Caixa Postal 64532 - 05402-970 - São Paulo SP  
[www.ib.usp.br/ceo/cbro/home.html](http://www.ib.usp.br/ceo/cbro/home.html)

Presidente Emérito: Fernando da Costa Novaes. Conselho Consultivo: Edwin O'Neill Willis, Hélio F. de Almeida Camargo, Walter Adolfo Voss, William Belton. Presidente: José Fernando Pacheco. Vice-Presidente: Luiz Fernando de Andrade Figueiredo. Comitê Efetivo: Fernando Costa Straube (Primeiro Secretário), Dimas Pioli (Segundo Secretário), Jeremy Minns (Secretário Internacional), Luis Fábio Silveira (Tesoureiro), Alexandre Aleixo, Ana Beatriz Aroeira Soares, Fábio Olmos, Francisco Mallet-Rodrigues, Glayson Ariel Bencke, Marcos Ricardo Bornschein, Mario Cohn-Haft, Ricardo Parrini, Rudi Ricardo Laps.